

И.П.Антонов, В.Я.Латышева, В.Б.Шалькевич, С.В.Веренич

ПОКАЗАТЕЛИ ЛЕТАЛЬНОСТИ ПРИ ЦЕРЕБРО-ВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

НИИ неврологии, нейрохирургии и физиотерапии МЗ РБ

Проведен анализ абсолютных показателей летальности жителей Беларуси по возрасту и полу, умерших вследствие цереброваскулярных болезней (ЦВБ) с гипертонической болезнью (ГБ) в 1982-1992 гг.

Число летальных случаев среди мужчин разных возрастных групп в 1992г. снизилось на 15,8%. Наиболее значительным этот показатель был у лиц в возрасте 25-60, 70 лет и старше. Число смертельных случаев в возрастных группах старше 60 лет увеличилось. При сравнительном анализе летальных случаев до и после аварии на Чернобыльской АЭС (в 1985 и 1987гг.) наблюдалась тенденция к снижению в целом по республике как у лиц наиболее трудоспособного возраста (35-50 лет), так и в старших возрастных группах. И только в 1991г. зафиксирован незначительный рост летальных исходов в возрасте 40-44 и 60-69 лет. У более пожилых людей этот показатель снижался или же оставался на уровне величин до аварии на ЧАЭС. В 1992г. соотношение сохранялось.

Летальность при этой патологии у женщин в целом по республике также имела тенденцию к снижению, но в значительно меньшей степени (13,3%). В сравнительном аспекте 1985 и 1987гг. число летальных случаев у женщин в 30-34 года составило соотношение 1:4; 40-44 - 2,5:1. В последующие годы в остальных возрастных группах отмечалась тенденция к снижению показателя.

Вместе с тем, значительный рост летальности отмечен при ЦВБ, обусловленных атеросклерозом, сахарным диабетом, заболеваниями сердца при неизмененном артериальном давлении. У мужчин она возросла на 32,6%, у женщин - на 26,3%. Суммарный прирост летальности по обеим группам заболеваний составил в мужской популяции 16,8%, в женской - 13,0%.

Таким образом сосудистая патология головного мозга наблюдалась значительно чаще при ЦВБ без ГБ.