

ОТДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК АН БССР
БЕЛАРУССКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ БОТАНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

БОТАНИКА

(ИССЛЕДОВАНИЯ)

ВЫПУСК XXI

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

МИНСК
«НАУКА И ТЕХНИКА»
1979

УДК 581.526.42+634.0.81] (476)

B. B. Маврищев

**СИНУЗИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
СТРУКТУРЫ НИЖНИХ ЯРУСОВ
ФИТОЦЕНОЗОВ ЕЛЬНИКОВ КИСЛИЧНЫХ
БЕЛАРУССКОЙ ССР¹**

Из всех типов леса на территории Белоруссии наиболее распространен ельник кисличный. Он занимает 232,8 тыс. га, что составляет 38,7% всех еловых лесов республики.

Ельники кисличные Белорусской ССР рассматривались наряду с другими типами еловых лесов во многих монографиях белорусских геоботаников [2, 5, 7, 8], однако синузиальное сложение их нижних ярусов не подвергалось анализу. В настоящей работе характеризуются основные синузии живого напочвенного покрова фитоценозов ельников кисличных и приводится их типизация для лесорастительных условий Белоруссии.

Ельники кисличные занимают, как правило, местоположения с ровным рельефом, приуроченным к небольшим склонам и пониженному плато. Произрастают в основном на дерново-подзолистых, слабо- и среднеоподзоленных (иногда сильно-оподзоленных) суглинистых и пылевато-суглинистых почвах с залеганием грунтовых вод около 150—200 см.

И. Д. Юркевич, Д. С. Голод и В. И. Парfenov (1971), по данным механического анализа, выделяют в ельнике кисличном две почвенные разности. Почва первого типа развивается на суглинке среднем лессовидном, подстилаемом мореной. Для данного типа почвы характерно высокое содержание физических глины и илистых частиц. Почва второго типа развивается на суглинках тяжелых лессовидных, подстилаемых горновалунной мореной.

Древостой ельника кисличного изменяется по мере продвижения с севера на юг республики от чистого монодоминантного до сложного, с примесью дуба черешчатого, осины, бересклета, ольхи чёрной.

Наибольшего распространения ельник кисличный достигает на севере и северо-востоке республики. Основные площади его приходятся на Оршанско-Могилевский лесорастительный район (табл. 1). По мере продвижения к югу площадь ельников кисличных, как и общая площадь еловых лесов, уменьшается. Однако доля участия ельников кисличных в

¹ Работа выполнена под руководством доктора биологических наук В. С. Гельтмана.

Таблица I. Равнотягивание санного экипажа по грунтовым покрытиям
в лесоразделенных районах БССР

Коэффициент трения	Приемы равнотягивания			Приемы тягивания			Приемы тягивания на грунтовых покрытиях		
	% к тяганию в лесоразделенном районе	% к тяганию в лесоразделенном районе	% к тяганию в лесоразделенном районе						
Нескользящий	50,0	9,4	19,7	38,6	6,2	11,3	14,2	29,4	8,9
Слабоскользящий	37,6	7,1	15,1	44,5	7,1	17,9	15,6	41,6	7,6
Браславский и Лиценецкий	33,3	6,3	20,6	24,1	3,7	13,3	11,6	34,8	6,7
Много по району	100,0	22,8	19,4	100,2	17,0	14,2	11,4	34,3	9,2
Нескользящий	41,9	7,7	14,9	19,4	3,1	7,1	10,8	20,4	6,3
Берес.-Березинский	67,9	1,9	10,9	3,5	0,7	1,1	1,5	21,1	0,2
Минско-Брестский	87,6	12,8	17,3	61,4	9,3	15,7	25,1	8,7	12,3
Много по району	105,5	21,8	15,8	85,3	13,6	11,7	37,4	12,4	8,3
Слабоскользящий	40,1	15,1	7,2	84,4	13,6	40,2	44,1	55,1	21,5
Белес.-Логгинский	35,8	6,8	9,9	44,2	7,4	12,2	11,8	41,4	7,2
Сокольский	10,9	2,0	0,7	10,5	1,7	9,8	31,2	29,8	1,5
Беседский	10,3	2,3	15,4	21,4	5,4	27,0	5,1	11,3	2,5
Много по району	100,0	19,3	100,2	98,7	21,9	15,2	18,4	32,7	11,2
Много по пологим	100,0	10,6	61,4	25,4	16,7	15,4	12,9	41,9	4,5

Показания к тяганию санного экипажа в лесоразделенных районах БССР

Оригинальный прием	Приемы тягания			Приемы тягания на грунтовых покрытиях		
	% к тяганию в лесоразделенном районе	% к тяганию в лесоразделенном районе	% к тяганию в лесоразделенном районе			
Оригинальный прием	40,1	15,1	7,2	84,4	13,6	40,2
Белес.-Логгинский	35,8	6,8	9,9	44,2	7,4	12,2
Сокольский	10,9	2,0	0,7	10,5	1,7	9,8
Беседский	10,3	2,3	15,4	21,4	5,4	27,0
Много по району	100,0	19,3	100,2	98,7	21,9	15,2
Много по пологим	100,0	10,6	61,4	25,4	16,7	15,4

Неманско-Предполесский район

Неманский	32,5	6,1	9,9	20,6	3,3	6,3	7,7	23,7	3,8	37,3	3,8
Нализбокский	15,1	2,9	13,6	15,1	2,4	13,6	6,8	38,7	2,8	38,7	2,8
Волковысско-Новогрудский	31,7	6,0	13,3	40,7	6,5	17,1	13,0	41,0	6,4	31,9	2,4
Белореческий	6,8	1,3	9,0	12,1	1,9	16,1	2,6	38,6	1,3	21,7	2,4
Западно-Предполесский	16,1	3,0	6,9	17,0	2,7	7,3	7,2	44,9	3,5	42,6	6,2
Итого по району	102,2	19,3	10,4	105,5	16,8	10,7	36,3	35,7	17,5	34,6	3,3

Березинско-Предполесский район

Центрально-Березинский	14,8	2,8	6,0	32,9	5,3	13,3	6,0	40,9	3,0	12,3	3,1
Центрально-Предполесский	6,5	1,2	3,2	12,9	2,1	6,4	2,2	33,5	1,1	16,9	5,2
Чечерско-Приднепровский	19,1	3,6	7,1	36,7	5,9	13,6	9,7	50,5	4,7	26,2	2,7
Итого по району	40,4	7,6	5,6	82,5	13,3	11,5	17,9	44,2	8,8	21,6	3,8
Итого по подзоне	14,6	26,9	8,4	188,0	30,1	11,0	54,2	38,1	26,3	28,9	3,5

Подзона широколиственно-сосновых лесов

Бугско-Полесский район

Бугско-Полесский	1,2	0,2	0,6	4,8	0,8	2,5	0,2	17,5	0,1	4,5	7,0
Пинско-Притяцкий	5,9	1,1	2,0	14,0	2,2	4,8	2,6	44,6	1,3	18,6	9,3
Итого по району	7,1	1,3	1,5	18,8	3,0	3,9	2,8	39,9	1,4	15,0	10,2

Полесско-Приднепровский район

Центрально-Полесский	3,1	0,6	0,7	18,7	3,0	4,2	1,2	40,0	0,6	6,5	9,5
Припятско-Мозырский	0,3	0,05	0,1	10,6	1,7	4,9	0,035	11,7	0,05	0,3	2,4
Южно-Полесский	0,2	0,03	0,1	3,6	0,8	1,9	0,015	8,5	0,05	0,4	4,5
Гомельско-Приднепровский	1,1	0,3	0,5	33,5	5,4	11,6	0,5	37,2	0,3	1,5	3,2
Итого по району	5,0	0,98	0,4	66,4	10,9	5,8	1,8	36,4	1,0	2,7	6,3
Итого по подзоне	12,1	2,3	0,7	85,2	13,9	5,2	4,6	38,4	2,4	5,4	7,4
Итого по БССР	525,6	100,0	9,5	625,0	100,0	11,2	232,8	38,7	100,0	32,8	

сложении еловых лесов в трех геоботанических подзонах остается примерно одинаковой (немногим более 38%).

Роль данного типа леса в типологической структуре лесов региона хорошо отражает коэффициент относительного распространения типа леса. Этот коэффициент показывает отношение процента участия типа леса в типологической структуре одной формации к проценту участия всех типов леса данной серии в общей типологической структуре всех лесных формаций [1, 6]:

$$K_{\text{ср}} = \frac{T\Phi}{\Phi\Sigma},$$

где T — площадь типа леса; ΣT — площадь серии, включающей данный тип; Φ — площадь формации, включающей данный тип; $\Sigma\Phi$ — площадь всех лесов данного региона.

Увеличение коэффициента относительного распространения ельников кисличных в южных регионах наглядно показывает повышение доли участия последних в типологической структуре еловых лесов (табл. 1). Так, коэффициент относительного распространения ельников кисличных на юге Белоруссии увеличивается в Полесско-Приднепровском лесорастительном районе до 6,3, а в Бугско-Полесском районе — до 8,2, т. е. он в 2,6 и в 4,3 раза выше, чем в Западно-Двинском (коэффициент 2,4). В табл. 1 можно заметить некоторые колебания коэффициента относительного распространения ельников кисличных в пределах лесорастительных районов. Например, в Оршанско-Могилевском районе в Бесседском комплексе лесных массивов коэффициент составляет 1,5, а в Березинско-Друцком комплексе — 3,4. Объясняется это тем, что при топографической обработке в последующем сравнении комплексов лесных массивов не учитываются их природные условия и ритико-географическое положение на местности.

Наглядное представление коэффициентов относительного распространения ельников кисличных покажем на схеме с севера на юг в меридиональном направлении (табл. 2).

Таким образом, параллельно с уменьшением еловых лесов в общей структуре лесов каждого региона и Белоруссии в целом степень участия ельников кисличных в них возрастает (см. табл. 1). Доля ельников кисличных в Центрально-Полесском лесном массиве по сравнению с самым северным Полоцким комплексом увеличивается в 2 раза, в то время как общая площадь еловых лесов уменьшается в 16 раз.

Увеличение коэффициента относительного распространения ельников кисличных в южных регионах наглядно показывает повышение доли участия последних в типологической структуре еловых лесов. На первый взгляд эти данные ка-

Таблица 2. Изменение коэффициентов относительного распространения ельников кисличных в меридиональном направлении с севера на юг республики

Комплекс лесных массивов	K _{ор}	Площадь еловых лесов		Площадь ельников кисличных		
		тыс. га	% к общей площади ельников	% к общей площади лесов региона	% к общей площади ельников региона	% к площади кисличной серии региона
Полоцкий	2,5	50,0	9,4	14,7	28,4	36,8
Верхне-Березинский	3,0	6,9	1,3	10,9	21,3	33,0
Центрально-Березинский	3,1	14,8	2,8	6,0	40,9	12,3
Центрально-Предполесский	5,2	6,5	1,2	3,2	33,5	16,9
Центрально-Полесский	9,5	3,1	0,6	0,7	40,0	6,5

жутся противоречивыми, так как еловые леса, и особенно высокопродуктивные ельники кисличные, занимают зандфоты с плодородными почвами, а область распространения благоприятных для роста ели почв находится на северную часть республики. Объяснить большое участие ельников кисличных на юге Белоруссии вблизи южной границы силошино-го распространения ели можно исходя из того, что в экстремальных для вида-лесообразователя условиях (в данном случае для ели) типологическая структура формации данного вида сужается до типов леса и ассоциаций, приуроченных к оптимальным экотопам [1]. Таким образом, у южной границы своего сглошного распространения еловые фитоценозы представлены суженным эколого-фитоценотическим рядом и ограничены высокопродуктивными типами леса [6].

Изучение синузиальной структуры фитоценозов ельников кисличных проводилось путем закладки типологически пробных площадей. За время исследований было заложено 20 пробных площадей по всей территории республики. Привлечены также некоторые литературные материалы [2, 7].

На каждой ТПП детально исследовался травяно-кустарничковый ярус. Древостою, подросту и подлеску давалась общая характеристика без применения методики сплошного перечета. Синузии нижних ярусов фитоценозов ельников кисличных выделялись глазомерно непосредственно при геоботаническом описании фитоценозов. Для получения конкретных статистических параметров каждой синузии на ТПП проводилось описание растительности по раункиерам. Площадки 1×1 м в количестве 25 либо 20 штук закладывались в шахматном порядке. Описывался видовой состав каждой

учетной площадки с указанием средней высоты каждого вида растения и его проективного покрытия в процентах.

Дальнейший анализ растительности по раункиерам — составление сводных списков растений, в которых последние объединялись в зависимости от приуроченности их к той или иной экологической группе по отношению к степени увлажнения и характера трофности почвы — позволил конкретизировать сложение тех или иных синузий.

Для каждого вида вычислялись его встречаемость (в процентах от общего числа учетных площадок), частное проективное покрытие и обилие. Частное проективное покрытие почвы данным видом вычислялось по формуле

$$ЧП = \frac{\text{общее проективное покрытие вида}}{\Sigma \text{общих проективных покрытий всех видов на пробе}} \times 100\%.$$

Синузии рассматриваются как эколого-биологические структурные части растительного сообщества, обладающие сходным набором экологических элементов. Синузии являются одногруппными структурными частями и представляют собой одновидовые или многовидовые группировки растений одной или нескольких жизненных форм в пределах фитоценоза, сформированные определенными экологическими условиями, территориально компактные или разобщенные, с наличием взаимодействий между их компонентами или без таковых. За основополагающий признак при выделении синузии принимались эколого-биоморфическая однородность растений и экологическая однородность условий местообитания.

Травяно-кустарниковый ярус ельников кисличных представлен 74 видами высших растений. В большинстве они принадлежат к мезофитной экологической группе. По уровню константности отмеченные нами виды напочвенного покрова можно разделить на три группы. К первой (высшая константность) можно отнести следующие виды: кислица обыкновенная, черника, ожика волосистая, майник двулистный, ветренница луговая, костянка, зеленчук желтый, печеночница обыкновенная, седмичник европейский, осока лесная, сныть обыкновенная и фиалка собачья. Вторую группу (средняя константность) составляют живучка ползучая, ландыш майский, щитовник игольчатый и голокучник Линнея. Остальные 58 видов обладают довольно низкой константностью. Это выражается прежде всего в том, что они характеризуются низкой встречаемостью и низким баллом обилия.

Анализ синузиального сложения фитоценозов ельников кисличных позволил выявить 11 основных синузий живого напочвенного покрова. Видовая насыщенность синузий колеблется от маловидовых до более обильных по составу. Встреча-

ются также одновидовые, чистые синузии, к которым относят кисличная, черничная и мицумовая. Следует отметить, что кисличная синузия в чистом виде приурочена большей частью к северу республики, где она часто образует зональный вариант, в состав которого наряду с кислицей входит линнея северная. На юге республики такой вариант отсутствует.

Всю совокупность выделенных нами синузий можно разделить на однородные группы, в состав которых входят одно-

Таблица 3. Основные синузии живого напочвенного покрова ельников кисличных

Синузия	Классификационная группа
Кисличная	Конституционная
а) вариант с линнеей северной	Зональная
Копытно-печеночницево-кисличная	Конституционная
Ветренично-кисличная	»
а) вариант с копытнем европейским	Зонально-замещающая
б) вариант без копытня	»
Зеленчуково-кисличная	Конституционная
а) вариант с ясменником пахучим	Зонально-замещающая
б) вариант без ясменника	»
Майниково-кисличная	Конституционная
Мицумовая	»
Папоротниковая	Сопутствующая
Костанично-черничная	»
Осоково-вейниковая	Диагессивная
Плевроциумовая	Контактия
Черничная	»

тические синузии, объединенные по характеру динамики и фитоценотической роли в сообществе. Ниже рассматриваются синузии нижних ярусов ельников кисличных согласно предложенным классификационным группам (табл. 3).

Л. Группа конституционных синузий. Сюда относятся коренные синузии данного типа леса. Они характерны для данной серии типов леса и встречаются почти во всех ассоциациях этого леса (в данном случае ельника кисличного). К этой группе относятся кисличная, копытно-печеночницево-кисличная, ветренично-кисличная, зеленчуково-кисличная, майниково-кисличная и мицумовая синузии.

Кисличная синузия может быть одновидовой и состоять из одного вида — кислицы обыкновенной. В качестве незначительной примеси в ее состав могут входить и некоторые другие виды — майник двулистный, ветреница дубравная, ожика волосистая, зеленчук желтый, земляника лесная, печеночница обыкновенная и звездчатка средняя.

Таблица 4. Флористический состав кисличных синузий
(группа конституционных синузий)

№	Кислица			Майник			Ветреница			Ожика			Зеленчук			Земляника			Звездчатка			Синузия в целом	
	ОП	ЧП	%	ОП	ЧП	%	ОП	ЧП	%	ОП	ЧП	%	ОП	ЧП	%	ОП	ЧП	%	ОП	ЧП	%	ОП	ЧП
11	28,6	86,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,6	86,4
12	7,8	78,0	0,6	6,0	0,1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,5	85,0
13	44,7	88,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,7	88,0
17	50,0	82,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50,0	82,3
16	66,8	90,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66,8	90,1
14	53,3	95,8	1,7	2,7	2,4	3,9	0,4	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57,8	93,0
15	25,0	46,2	3,8	7,6	2,2	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,0	58,2
8	6,8	56,6	0,5	4,3	—	—	0,1	0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	63,8
16	28,4	67,2	3,9	9,3	—	—	—	—	2,0	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,3	81,3
13	143,6	0,7	1,0	—	—	—	—	—	—	—	2,4	3,5	3,7	5,4	36,9	53,5	—	—	—	—	—	—	

Примечание. Здесь и далее ОП — общее проективное покрытие почвы данным видом (в %), ЧП — частное проективное покрытие почвы данным видом (в %).

Для характеристики выделенных синузий нами предложен такой количественный параметр, как частное проективное покрытие синузии. Данная величина складывается из суммы частных значений для видов, образующих синузию. В случае, если синузия формируется только одним видом, этот показатель выражается частным проективным покрытием этого вида. Частное проективное покрытие синузии объективно показывает, какую долю от проективного покрытия видов, составляющих фитоценоз, составляют виды, образующие синузию, и вычисляется в процентах.

Как видно из табл. 4, частное проективное покрытие кисличных синузий довольно высокое и не опускается ниже 50%. Это отличительная особенность синузий конституционной группы.

Майниково-кисличная синузия состоит из кислицы, майника, ожика волосистой, ландыша майского и приурочена в фитоценозе к более освещенным местам. Основная роль в сложении этой синузии принадлежит кислице и майнику.

Ветренично-кисличная и зеленчуково-кисличная синузии, являясь конституционными, могут быть представлены каждая своим зональным вариантом, которые различаются из-за присутствия дифференцирующих видов. Так, для ветренично-кисличной синузии, в состав которой входят кислица, ветреница двуоривная, майник двулистный, седмичник европейский, зеленчук желтый, ожика волосистая таким дифференцирующим

видом будет копытень европейский (табл. 5). Вариант этой синузии с копытнем приурочен большей частью к северу республики. Основной процент проективного покрытия видов здесь падает также на ветреницу и кислицу.

Зеленчуково-кисличная синузия тоже представлена двумя вариантами. В нее входят кислица, зеленчук желтый, майник двулистный, печеночница обыкновенная, копытень европейский, живучка ползучая, звездчатка ланцетная и ясменник пахучий, который является дифференцирующим видом для данной синузии. Второй вариант более характерен для северной части Белоруссии. В нем ясменник отсутствует.

Копытне-печеночницео-кисличная синузия включает кислицу, печеночницу обыкновенную, копытень европейский, ветреницу дубравную, живучку ползучую, сныть обыкновенную и ожiku волосистую.

Миумовая синузия состоит из одного вида — *Mnium gigpidatum*.

Б. Группа сопутствующих синузий. К синузии этой группы относятся такие, которые получают хорошее развитие в данном типе леса, но не являются здесь конституционными, коренными. Они часто встречаются вместе с последними, занимая экологические ниши по соседству. В ельниках-кисличниках это синузии папоротниковая и костянично-черничная.

В состав папоротниковой синузии входят различные лесные папоротники. Это щитовник игольчатый, голокучник Линнея и кочедыжник женский. Следует указать, что данная синузия развивается на хорошо освещаемых местах, зачастую также и более увлажненных.

В сложении костянично-черничной синузии эдифицирующую роль играют полукустарнички.

Таблица 5. Флористический состав ветренично-кисличных синузий
(группа конституционных синузий; ТПЛ 3—6, 10, 15,
19 — зонально-замещающие варианты)

Номер	Ветреница		Кислица		Майник		Седмичник		Зеленчук		Ожичка		Копытень		Синузия в целом	
	Б	Ч	Б	Ч	Б	Ч	Б	Ч	Б	Ч	Б	Ч	Б	Ч	Б	Ч
3	3,6	5,9	48,1	78,6	1,6	2,6	0,1	0,2	2,2	3,6	0,1	0,6	—	—	53,7	91,5
4	5,2	5,5	44,4	46,8	2,4	2,5	2,4	2,5	—	—	0,5	0,5	—	—	54,9	57,8
5	8,0	8,4	70,4	74,0	5,2	5,5	0,1	0,1	3,0	3,2	1,2	1,3	—	—	87,9	92,5
6	6,7	20,6	15,0	46,0	1,7	5,2	—	—	1,0	3,1	0,2	0,6	—	—	24,8	75,5
10	4,7	15,3	18,0	58,4	—	—	—	—	0,8	2,6	0,3	1,0	0,1	0,3	23,9	77,8
15	2,2	4,4	23,9	46,2	3,8	7,6	—	—	2,2	4,4	—	—	5,1	10,3	36,3	72,9
19	0,4	0,7	42,5	78,0	3,3	6,1	0,1	0,2	0,8	1,5	—	—	0,1	0,2	47,2	86,7

Таблица 6. Флористический состав плевроциумовых синузий
(группа контактных синузий)

№ пп.	Pleurozium schreberi		Distegia undulatum		Hylocomium splendens		Синузы в целом	
	оп	чп	оп	чп	оп	чп	оп	чп
4	25,6	26,2	0,2	0,6	—	—	27,2	28,8
21	12,6	13,9	5,7	6,3	—	—	16,3	20,2
22	56,5	55,7	16,0	7,3	10,4	4,7	82,9	57,7
23	12,5	8,9	26,2	18,6	—	—	38,7	27,5
24	18,5	10,5	40,6	23,0	—	—	59,1	33,5
25	16,2	14,8	10,4	9,5	5,0	4,6	31,6	28,9

Синузы этой группы характеризуются невысоким частным проективным покрытием, не превышающим, как правило, 30%. Этим они отличаются от синузий конституционной группы.

В. Дигрессивные синузы. Такие синузы появляются в сквозе в результате антропогенных воздействий. Сюда мы относим осоково-вейниковую синузию, которая встречается большей частью в измученных фитоценозах и состоит из осоки лесной и вейника ланцетного; как правило, частное проективное покрытие видов данной синузии небольшое и не превышает 15%.

Г. Группа зонально-замещающих синузий включает синузы, в состав которых присутствуют виды, характерные для определенного геоботанического региона. Это региональные варианты ветренично-кисличной и зеленчуково-кисличной синузий. Сюда же можно отнести и зональные синузы, т. е. варианты основных синузий, произрастающих только в одном регионе и не имеющих замещающего варианта в другом. В данном случае это будет зональный вариант кисличной синузии, в состав которой входит лилия северная.

Д. К группе контактных синузий, граничащих экотопически с синузиями других типов леса, нами отнесены черничная и плевроциумовая. Черничная синузия одновидовая, чистая. Плевроциумовая синузия включает в себя зеленые мхи — *Distegia undulatum*, *Picrorhiza schreberi*, *Hylocomium splendens* (табл. 6).

Как видно из табл. 6, частное проективное покрытие данной синузии достигает почти 40% благодаря близкому соседству с эдафотопами, где данная синузия может являться конституционной. Из-за сходных условий среды контактные синузии мигрируют из соседних фитоценозов и, хотя не получают в данном типе условий произрастания достаточного

киненного пространства для своего развития, тем не менее играют существенную роль в его синузиальном сложении.

Всю растительность фитоценоза можно разбить на синузы, однако флористический состав фитоценоза может включать виды, представленные одиночными особями. Такие виды не включаются в состав каких-либо конкретных синузий, но они учитываются при анализе его синузиального сложения и выделяются в особую группу, характеризующуюся, как правило, низкими величинами проективного покрытия и обилия. Таким образом, такая группа видов не имеет особой фитоценотической значимости и не может оказывать особого влияния на синузиальную структуру фитоценоза.

В табл. 7 показано синузиальное сложение некоторых фитоценозов еловых лесов кисличного типа местопроизрастания.

Синузиальную структуру нижних ярусов растительности на ТПП № 4 составляют 3 синузы, располагающиеся в 3 яруса. Флористический состав данного фитоценоза насчитывает 19 видов. Из них 10 образуют синузы (кисличная — 6, костянично-черничная — 2 и плевроциумовая — 2), а 9 видов не входят в их состав. Однако несмотря на такое количество видов, не вошедших в состав синузий, частное проективное покрытие их мало и составляет всего лишь 5% от суммарного для всех видов фитоценоза.

Степень участия видов, не составляющих синузий в сложении флористического состава ТПП № 19, еще меньше, чем на ТПП № 4 — 3,3%. Таких видов здесь 3 из 14, зарегистрированных на данной типологической пробной площади. А на ТПП № 12 все виды участвуют в сложении синузий нижних ярусов растительности ельников кисличного типа.

Итак, синузиальную структуру фитоценозов ельников кисличных Белорусской ССР образуют 11 основных синузий живого напочвенного покрова, которые в разных сочетаниях входят в состав фитоценозов этого типа леса.

Таблица 7. Синузиальная структура некоторых фитоценозов ельников кисличных

Синуза	ТПП № 4		ТПП № 19		ТПП № 12	
	оп	чп	оп	чп	оп	чп
Костянично-черничная	6,6	7,0	1,0	1,9	—	—
Осоково-вейниковая	—	—	5,1	9,4	—	—
Палоротниковая	—	—	0,6	1,1	1,5	15,0
Кислично-майниковая	—	—	45,9	84,3	—	—
Кисличная	56,2	59,2	—	—	8,5	85,0
Плевроциумовая	27,2	28,2	—	—	—	—
Прочие виды	4,8	5,0	1,9	3,3	—	—
Покрытие синузиями в целом	90,0	95,0	52,6	96,7	10,0	100,0

РЕЗЮМЕ

Излагаются результаты исследования синузиальной структуры ельников в различных Белорусской ССР. Приводятся характеристика и количественные показатели отдельных синузий нижних ярусов фитоценозов ельнико-хвойных насаждений. Типизация выделенных синузий по группам.

ЛИТЕРАТУРА

- 1 Гельтман В. С. Эколого-географический и типологический анализ лесной растительности Белоруссии. Автореф. докт. дис. Минск, 1973.
- 2 Голод Д. С. Типы и ассоциации еловых лесов северо-восточной части Белоруссии ССР. Автореф. канд. дис. Минск, 1966.
- 3 Мавришев В. Е. Синузиальное сложение фитоценозов березняков хвойных (эколого-фитоценотический анализ). В сб.: Ботаника (исследования). Вып. 20 Минск 1978
- 4 Парфенов В. И. Лесообразующая роль ели и особенности еловых фитоценозов в Полесье В сб.: Ботаника (исследования). Вып. 3. Минск, 1964.
- 5 Юркевич И. Д., Гельтман В. С. География, типология и районирование лесной растительности Белоруссии. Минск, 1966.
- 6 Юркевич И. Д., Гельтман В. С. Типы леса и лесные ассоциации как показатель адаптации фитоценозов к экстремальным условиям среди в границах распространения древесных пород в Белоруссии. В сб.: Вопросы адаптации растений к экстремальным условиям. Сочин. Петроводск, 1975.
- 7 Юркевич И. Д., Голод Д. С., Парфенов В. И. Типы и ассоциации еловых лесов. Минск, 1971.
- 8 Юркевич И. Д., Левчий Н. Ф., Гельтман В. С. Леса Белорусского Полесья. Минск, 1977.

Институт экспериментальной ботаники
им. В. Ф. Купрентса АН БССР.
Лаборатория продуктивности и водного режима фитоценозов