

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ
ОБСЛЕДОВАНИЙ

Е.К. Агеенкова, Г.С. Борисова
(Минск)

Интенсификация жизни несомненно является одной из причин роста сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у людей определенного психологического склада. В связи с этим возникает необходимость проведения специального профотбора как с целью выбора более способных специалистов, так и для пре-

дупреждения у них сердечно-сосудистых заболеваний. С этой целью нами проводилось сопоставление эффективности операторской деятельности при проведении информационной пробы с данными психологического обследования по тесту ММР1. Были обследованы мужчины в возрасте 40-59 лет, среди которых по нозологическому признаку были выделены 4 группы: здоровые (З), пограничная гипертония (ПГ), артериальная гипертония (АГ) и ИБС. Всего обследовано 14 человека.

Данные математической обработки показали, что в группе З нет различий в профиле личности по тесту ММР1 между эффективно работающими и неэффективно работающими. В группе АГ и ИБС более эффективной работе сопутствует повышение шкалы социальной интроверсии. Кроме этого, в группе ИБС выявлено повышение шкалы депрессии, а в группе АГ понижение шкалы психопатии.

Наиболее выделяются в данном аспекте больные с ПГ. Среди них менее эффективно работают люди с повышением шкал невротической триады (неврозности, депрессии и истерии), а также с повышением шкалы психастении. Корреляционный анализ также выявил в данной группе зависимость эффективности выполнения операторской работы от уровня шкал депрессии, психастении и социальной интроверсии.