

УДК 581.552(476)

## Я. М. СЦЕПАНОВІЧ ФІТАЦЭНАРАЗНАСТАЙНАСЦЬ РАСЛІННАСЦІ БЕЛАРУСІ

**Уводзіны.** Праблема ацэнкі й захавання біялагічнай разнастайнасці ўзнікла яшчэ ў канцы 19 ст. і зараз набыла планетарны маштаб. Сведчанне таму – адмысловая канферэнцыя Арганізацыі Аб’яднаных Нацый у Рыю-дэ-Жанейро (5 чэрвеня 1992 г.) і падпісанне “Канвенцыі аб біялагічнай разнастайнасці”. У Канвенцыі адлюстравана ўсведамленне вечнай каштоўнасці біяразнастайнасці, яе значэнне для эвалюцыі й захавання сістэмаў біясферы, якія падтрымліваюць жыццё, і падкрэслена, што захаванне біяразнастайнасці – агульная задача ўсяго чалавецтва [1].

Згодна з прынятай Канвенцыяй пад біялагічнай разнастайнасцю разумеецца “варыяцыйнасць жывых арганізмаў з усіх крыніцаў, уключаючы, між іншым, наземныя, марскія й іншыя водныя экасістэмы й экалагічныя комплексы, часткай якіх яны з’яўляюцца; гэта паняцце ўключае ў сябе разнастайнасць у рамках віда, паміж відамі й разнастайнасць экасістэмаў” [1: с. 5]. Такім чынам, паняцце “біяразнастайнасць” распаўсюджваецца ня толькі на віды й папуляцыі, але перад усім на супольніцтвы (біяцэнозы) і экатопы, ад якіх арганізмы й папуляцыі відаў цалкам залежныя.

Вядома, што існаванне выключна ўсіх відаў, папуляцый і супольніцтваў магчыма толькі ў пэўных умовах асяроддзя. Таму захоўваць трэба комплексныя прыродныя ўтварэнні – супольніцтвы разам з экатопам, дзе яны фармуюцца, або экасістэмы, што й прадпрымаецца навукоўцамі-прыродаахоўнікамі пры вылучэнні, у прыватнасці, важных для птушак [2] і ключавых батанічных тэрыторый Беларусі [3]. Аднак калі сістэма арганізмаў на відавым узроўні ды ў сусветным маштабе даволі дасканала распрацавана, то сістэматызацыя супольніцтваў базуецца на розных метадычных падыходах, не ўніфікавана, а экалагічных комплексаў (экасістэмаў) навогул ня мае агульнай платформы спарадкавання, ня вызначана іх асноўная таксанамічная катэгорыя. У сістэматыцы расліннасці (сінтаксанаміі) найбольш шырокае ўжыванне атрымала экалага-фларыстычная класіфікацыя Й. Браўн-Бланке. На яе аснове Дж. С. Радвэллем і іншымі фітацэнолагамі складзена сінтаксанамічная зводка, дзе адлюстравана сучасная разнастайнасць расліннасці й экасістэмаў Еўропы [4].

На Беларусі, на жаль, няма цэласнай сістэмы як біяцэнозаў (супольніцтваў), так і экасістэмаў у цэлым, за выключэннем сінтаксанаміі прыродных катэгорый травяністай расліннасці [5], што сур’эзна ўскладняе ацэнку, ахову й устойлівае выкарыстанне біяразнастайнасці ня толькі расліннага свету. Яе адсутнасць не спрыяе й міжнароднаму супрацоўніцтву краіны ў прыродаахоўнай справе. Адсюль вынікае неабходнасць распрацоўкі ўніфікаванай сістэмы раслінных супольніцтваў і экатопаў.

**Аб'екты й метады даследаванняў.** Аб'ектам даследавання з'яўлялася расліннае покрыва, якое займае 20194,0 тыс. га, або 97,3% тэрыторыі Беларусі (**табліца 1**). Прыродныя раслінныя супольніцтвы сукупна ахопліваюць 13506,1 тыс. га, або 65,1% тэрыторыі й пададзены лясамі (8335,1 тыс. га, або 41,3%), лугамі (3289,7 тыс. га, або 16,3%), балотамі (916,2 тыс. га, або 4,5%), хмызнякмі (486,6 тыс. га, або 2,4%) і воднымі цэнозамі (478,5 тыс. га, або 2,4%). Амаль трэцюю частку пакрытай расліннасцю тэрыторыі (32,2%) займаюць сінантропныя (сегетальныя й бальшыня рудэральных) супольніцтвы, якія існуюць дзякуючы гаспадарчай дзейнасці чалавека. Сярод гэтай катэгорыі расліннасці значна пераважаюць супольніцтвы ворыўных земляў (палёў і агародаў) – займаюць 5547,9 тыс. га, або 27,5%. Таксама прыкметную плошчу (665,2 тыс. га, або 3,3%) ахоплівае расліннасць аблогаў і закінутых земляў. У значна меншай ступені пашыраны прыдарожныя супольніцтвы, а таксама расліннасць садоў і ягаднікаў і інш. (гл. табл. 1).

З улікам папярэдніх напрацовак [5–7] і аналізу сабраных аўтарам новых геабатанічных звестак (сукупна больш за 5 тыс. апісанняў) прадпрынята спроба распрацоўкі прадрому вышэйшых адзінак усіх названых катэгорый расліннасці Беларусі: лясной, лугавой, балотнай, хмызняковай, вадаёмаў, сегетальнай (пустазельна-палявой) і рудэральнай (сметнікавай). Пры гэтым выкарыстаны такі інтэгральны паказнік фітасупольніцтваў як эдыфікатарныя дамінанты [8]. Рэпрэзэнтацыйнасць геабатанічных апісанняў дасягалася метадам экалага-фітацэнатычных профіляў, або трансэктаў, які дазваляе ўлічваць усю фітацэнатычную разнастайнасць вывучальнай тэрыторыі [9].

Пэралік вышэйшых адзінак расліннасці (ад класа да асацыяцыі) складзены ў кантэксце міжнароднай сістэмы сінтаксонаў (EUNIS Habitat Classification) [4]. Ён пададзены ў выглядзе прадрому (**табліца 2**).

Табліца 1. Размеркаванне земляў, занятых расліннасцю, па стане на 1.01.2005 г. (у тыс. га)

Па Мінску і вобласцях	Агуль- ная плошча земляў	З іх па- крытых раслін- насцю	У тым ліку:									
			ворыў- ных	аблога- вых і невы- карыс- тальных	пад садамі і ягад- нікамі	луга- вых	лясных	пад хмызня- камі	пад ба- лотамі	пад вадой	пад даро- гамі, вулі- цамі два- рамі	іншых
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
г. Мінск	<u>28,1</u> <i>0,1</i>	<u>14,2</u> <i>50,5</i>	<u>0,9</u> <i>6,3</i>	<u>1,1</u> <i>7,8</i>	<u>0,5</u> <i>3,5</i>	<u>0,1</u> <i>0,7</i>	<u>2,8</u> <i>19,7</i>	<u>1,1</u> <i>7,8</i>	<u>0,0</u> <i>0,0</i>	<u>0,7</u> <i>4,9</i>	<u>6,9</u> <i>48,6</i>	<u>0,1</u> <i>0,7</i>
Брэсцкая	<u>3279,1</u> <i>15,8</i>	<u>3183,0</u> <i>97,1</i>	<u>811,3</u> <i>25,5</i>	<u>109,4</u> <i>3,4</i>	<u>20,5</u> <i>0,7</i>	<u>581,1</u> <i>18,3</i>	<u>1180,7</u> <i>37,1</i>	<u>53,5</u> <i>1,7</i>	<u>277,2</u> <i>8,7</i>	<u>83,5</u> <i>2,6</i>	<u>48,3</u> <i>1,5</i>	<u>17,0</u> <i>0,5</i>
Віцебская	<u>4004,9</u> <i>19,3</i>	<u>3918,0</u> <i>97,8</i>	<u>921,9</u> <i>23,5</i>	<u>67,4</u> <i>1,7</i>	<u>17,5</u> <i>0,5</i>	<u>659,8</u> <i>16,8</i>	<u>1630,2</u> <i>41,6</i>	<u>205,9</u> <i>5,3</i>	<u>217,8</u> <i>5,6</i>	<u>145,2</u> <i>3,7</i>	<u>43,5</u> <i>1,1</i>	<u>8,7</u> <i>0,2</i>
Гомельская	<u>4036,3</u> <i>19,5</i>	<u>3935,0</u> <i>97,5</i>	<u>804,5</u> <i>20,4</i>	<u>207,2</u> <i>5,3</i>	<u>20,0</u> <i>0,5</i>	<u>564,7</u> <i>14,3</i>	<u>1960,4</u> <i>49,8</i>	<u>61,7</u> <i>1,6</i>	<u>171,9</u> <i>4,4</i>	<u>81,8</u> <i>2,1</i>	<u>50,5</u> <i>1,3</i>	<u>12,6</u> <i>0,3</i>
Гродзенская	<u>2511,8</u> <i>12,1</i>	<u>2441,0</u> <i>97,2</i>	<u>838,9</u> <i>34,4</i>	<u>92,4</u> <i>3,8</i>	<u>16,4</u> <i>0,7</i>	<u>411,5</u> <i>16,9</i>	<u>884,1</u> <i>36,2</i>	<u>36,1</u> <i>1,5</i>	<u>80,3</u> <i>3,3</i>	<u>35,3</u> <i>1,4</i>	<u>35,4</u> <i>1,4</i>	<u>10,7</u> <i>0,4</i>
Мінская	<u>3991,6</u> <i>19,2</i>	<u>3869,0</u> <i>96,9</i>	<u>1291,6</u> <i>33,4</i>	<u>85,4</u> <i>2,2</i>	<u>29,8</u> <i>0,8</i>	<u>567,1</u> <i>14,6</i>	<u>1562,6</u> <i>40,4</i>	<u>81,2</u> <i>2,1</i>	<u>77,5</u> <i>2,0</i>	<u>95,0</u> <i>2,5</i>	<u>61,5</u> <i>1,6</i>	<u>17,0</u> <i>0,4</i>
Магілёўская	<u>2908,0</u> <i>14,0</i>	<u>2834,0</u> <i>97,5</i>	<u>878,8</u> <i>31,0</i>	<u>102,3</u> <i>3,6</i>	<u>14,5</u> <i>0,5</i>	<u>505,4</u> <i>17,9</i>	<u>1114,3</u> <i>39,3</i>	<u>47,1</u> <i>1,7</i>	<u>91,5</u> <i>3,2</i>	<u>37,0</u> <i>1,3</i>	<u>36,9</u> <i>1,3</i>	<u>6,3</u> <i>0,2</i>
<b>Усяго па краіне</b>	<b><u>20759,8</u></b> <b><i>100,0</i></b>	<b><u>20194,0</u></b> <b><i>97,3</i></b>	<b><u>5547,9</u></b> <b><i>27,5</i></b>	<b><u>665,2</u></b> <b><i>3,3</i></b>	<b><u>119,2</u></b> <b><i>0,6</i></b>	<b><u>3289,7</u></b> <b><i>16,3</i></b>	<b><u>8335,1</u></b> <b><i>41,3</i></b>	<b><u>486,6</u></b> <b><i>2,4</i></b>	<b><u>916,2</u></b> <b><i>4,5</i></b>	<b><u>478,5</u></b> <b><i>2,4</i></b>	<b><u>283,0</u></b> <b><i>1,4</i></b>	<b><u>72,4</u></b> <b><i>0,3</i></b>

Заўвага: у лічніку ўказана плошча, у назоўніку (курсівам) – працэнт ад агульнай плошчы земляў (графы 3) і агульнай плошчы пакрытых расліннасцю земляў (графы 4–13).

**Табліца 2. Прадромус вышэйшых адзінак расліннасці Беларусі**

Код	Супольніцтва
08	<b>Клас 1. Festuco-Puccinellietea Soó 1968 em. Vicherek 1973 – травяныя супольніцтвы на багатых працягла заліўных алювіяльных глебах</b>
08G	Ворда 1. Scorzonero-Juncetalia gerardii Vicherek 1973
08G02	Уніён 1. Beckmannion eruciformis Soó ap. Mathe 1933
	Асацыяцыя 1. Alopecuretum geniculati R. Tx. 1937 em. Stepanovič 2000 – каленчатабатлачыкавая
	Ас. 2. Agrostidetum stoloniferae Moor 1958 ex Müller et Oberdorfer in Müller 1961 em. Stepanovič 2000 – парасткаўтваральнамятліцавая
	Ас. 3. Juncetum atrati Vilcherek in Balátová-Tuláčková 1969 em. Stepanovič 2000 – чорнасітовая
	Ас. 4. Beckmannietum eruciformis R. Jovanovič 1958 – бекманніевая
	Ас. 5. Eleocharidetum uniglumis Stepanovič 2000 – адналускавабалотніцавая
11	<b>Клас 2. Honkenyo-Elymetea arenarii R. Tx. 1966 – прыбярэжныя атлантычныя травяныя супольніцтвы*</b>
11B	Ворда 1. Honkenyo-Elymetalia arenarii R. Tx. 1966
11B03	Уніён 1. Honkenyo-Elymion arenarii R. Tx. 1966 em. Géhu et R. Tx. in Géhu 1975
	Ас. 1. Elymetum arenarii Steffen 1931 – пясчанакаласняковая
17	<b>Клас 3. Lemnetea (minoris) de Bolòs et Masclans 1955 em. R. Tx. 1955 – супольніцтвы плавальных раслін*</b>
17A	Ворда 1. Lemnetalia minoris Bolòs et Masclans 1955 em. R. Tx. 1955
17A01	Уніён 1. Lemnion minoris (Koch 1954) Bolòs et Masclans 1955 em. R. Tx. 1955
	Ас. 1. Lemnetum minoris (Oberdorfer 1957) Müller et Görs 1960 – малараскавая
	Ас. 2. Lemnetum gibbae (Koch 1954) Mijawaki et J. Tx. 1960 – гарбатыраскавая
17A02	Уніён 2. Lemnion trisulcae Den Hartog et Segal ex R. Tx. et Schwabe in R. Tx. 1974
	Ас. 1. Lemnetum trisulcae (Soó 1927) Knapp et Staffers 1962 – трохдольчатараскавая
	Ас. 2. Riccietum fluitantis Slavnič 1956 – воднарыччыевая
17A03	Уніён 3. Lemno minoris-Hydroharition morsus-ranae (Passarge 1978) Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999 (Hydroharition Rübel 1933 em. Soó 1951)
	Ас. 1. Stratiotetum aloidis (Rübel 1920) Nowiński 1930 em. Miljan 1933 – целарэзавая
	Ас. 2. Hydrocharitetum morsus-ranae Van Langendonck 1935 – жабнікавая
19	<b>Клас 4. Potametea Klika in Klika et Novák 1941 em. R. Tx. et Preising 1942 – супольніцтвы прэснаводных вадаёмаў*</b>
19B	Ворда 1. Potametalia (eurosibiricum) Koch 1926 em. Br.-Bl. et R. Tx. 1944
19B01	Уніён 1. Ceratophyllion demersi Den Hartog et Segal ex Passarge 1996
	Ас. 1. Ceratophylletum demersi (Soó 1927) Eggler 1933 em. Hild 1956 – апушчанагагаліснікавая
19B03	Уніён 2. Nymphaeion albae (Koch 1926) Oberdorfer 1957
	Ас. 1. Potametum natantis Soó 1927 em. Oberdorfer 1977 – плавальнардэставая
	Ас. 2. Nupharetum luteae Koch 1926 – жоўтагарлачыкавая
	Ас. 3. Nupharetum pumili Oberdorfer 1957 – малагарлачыкавая
	Ас. 4. Nymphoidetum peltatae (Allorge 1922) Oberdorfer et Müller 1960 – балотнакветнікавая

	Ас. 5. <i>Trapaetum natantis</i> Müller et Görs 1960 – рагульнікавая
	Ас. 6. <i>Nymphaeetum candidae</i> (Hejný 1948) Mijan 1958 – чыстабелагарлачыкавая
	Ас. 7. <i>Nymphaeetum albae</i> Vollmar 1947 – белагарлачыкавая
19B04	Уніён 3. <i>Parvopotamion</i> (Vollmar 1947) Den Hartog et Segal 1964
	Ас. 1. <i>Potamogetonetum pectinati</i> Carstensen 1955 – грабенчатардэставая
	Ас. 2. <i>Potamogetonetum filiformis</i> Koch 1926 – ніткаватардэставая
	Ас. 3. <i>Potamogetonetum lucentis</i> Hueck 1931 – бліскучардэставая
	Ас. 4. <i>Potamogetonetum compressi</i> Tomaszewicz 1979 – сплюшчанардэставая
	Ас. 5. <i>Potamogetonetum perfoliati</i> Koch 1926 em. Passarge 1964 – праніцаналістардэставая
	Ас. 6. <i>Potametum crispum</i> Soó 1927 em. Klika et Nadač 1944 – кучаравардэставая
	Ас. 7. <i>Elodeetum canadensis</i> Egger 1933 – эладэвая
19B05	Уніён 4. <i>Magnopotamion</i> Vollmar 1947
	Ас. 1. <i>Najadetum marinae</i> (Oberdorfer 1957) Fukarek 1961 – морсканаядавая
19B06	Уніён 5. <i>Utricularion vulgaris</i> Passarge 1964
	Ас. 1. <i>Utricularietum vulgaris</i> Soó (1928) 1938 – звычайнаплывунцовая
20	<b>Клас 5. Montio-Cardaminetea Br.-Bl. et R. Tx. 1943 – крынічныя супольніцтвы*</b>
20B	Ворда 1. <i>Montio-Cardaminetalia</i> Pawłowski in Pawł., Sokoł., Wallisch 1928
20B02	Уніён 1. <i>Cardamino-Montion</i> Br.-Bl. 1926
	Ас. 1. <i>Cardaminetum amarae</i> Br.-Bl. 1926 – горкабуймінавая
	Ас. 2. <i>Petasitetum hybridum</i> Klika 1955 – гібрыднабелакапытнікавая
	Ас. 3. <i>Tussilagetum farfarae</i> Oberdorfer 1949 – падбелава
21	<b>Клас 6. Isoëto-Littorelletea Br.-Bl. et Vlieger 1937 – супольніцтвы водмеляў*</b>
21A	Ворда 1. <i>Littorelletalia (uniflorae)</i> Koch 1926
21A02	Уніён 1. <i>Eleocharition acicularis</i> Pietsch 1966 em. Dierssen 1975
	Ас. 1. <i>Eleocharitetum acicularis</i> (Baumann 1911) Koch 1926 – іголчатабалотніцавая
21A06	Уніён 2. <i>Potamion graminei</i> (Den Hartog & Segal 1964) Westhoff & Den Held 1969
	Ас. 1. <i>Hottonietum palustris</i> R. Tx. 1937 – вадаперыцавая
	Ас. 2. <i>Potamogetonetum graminei</i> (Koch 1926) Passarge 1964 em. Görs 1977 – злакавардэставая
21B	Ворда 2. <i>Utricularietalia intermedio-minoris</i> Pietsch 1965
21B01	Уніён 1. <i>Scorpidio-Utricularion minoris</i> Pietsch 1965
	Ас. 1. <i>Sparganietum minimi</i> Schaaf 1925 – малаплюшчаевая
23	<b>Клас 7. Phragmito-Magnocaricetea Klika (1942) 1944 – балоцістыя травяныя супольніцтвы</b>
23A	Ворда 1. <i>Nasturtio-Glycerietalia</i> Pignatti 1953 em. Kopecký 1965
23A01	Уніён 1. <i>Glycerio-Sparganion</i> Br.-Bl. et Sissingh 1942 ap. Boer 1942
	Ас. 1. <i>Sparganietum erectum</i> Roll 1938 – прамаплюшчаевая
	Ас. 2. <i>Glycerietum fluitantis</i> Wilzek 1935 em. Grynja et Cholava 1968 – наплыўнаманнікавая
23A02	Уніён 2. <i>Phalaridion arundinaceae</i> Kopecký (1960) 1961

	Ас. 1. Scirpetum silvatici Egglер 1933 em. Knapp 1946 – лесачаротавая
	Ас. 2. Phalaridetum arundinaceae Koch 1926 em. Libbert (1931) 1932 – трысняговачаротніцавая
	Ас. 3. Caricetum vulpinae Nowiński 1927 em. Soó 1927 – лісінаасакавая
23В	Ворда 2. Phragmitetalia (communis) Koch 1926 em. Pignatti 1953
23В04	Уніён 1. Magnocaricion elatae Koch 1926
	Ас. 1. Caricetum ripariae Soó 1928 – берагаваасакавая
	Ас. 2. Caricetum acutiformis (Sauer 1937) R. Тх. 1937 em. Soó 1938 – завостранаасакавая
	Ас. 3. Caricetum paniculatae Wangerin 1916 em. Von Rochow 1951 – мецёлчатаасакавая
	Ас. 4. Caricetum rostratae Rübel 1912 em. Balátová-Tuláčková 1963 – успухлаасакавая
	Ас. 5. Caricetum elatae Koch 1926 – высокаасакавая
	Ас. 6. Caricetum omskianae Korolyuk 1993 em. Stepanovič 2000 – омскаасакавая
	Ас. 7. Caricetum appropinquatae Koch 1926 em. Soó 1938 – збліжанаасакавая
	Ас. 8. Caricetum distichae (Nowiński 1928) Jonas 1933 em. Kopecký 1960 – двухрадковаасакавая
	Ас. 9. Scirpetum radicans Hejný in Dykyjová et Kvet 1978 – укараняльначаротавая
	Ас. 10. Caricetum gracilis (Allorge 1922) Soó 1927 em. R. Тх. 1937 – стройнаасакавая
	Ас. 11. Caricetum vesicariae Br.-Bl. et Denis 1928 – пухірчатаасакавая
	Ас. 12. Caricetum aquatilis Nordh. 1928 em. Dierßen 1982 – воднаасакавая
23В06	Уніён 3. Phragmition communis Koch 1926
	Ас. 1. Scirpetum lacustris (Allorge 1922) Chauard 1924 em. Schmale 1939 – азёрначаротавая
	Ас. 2. Typhetum angustifoliae (Allorge 1922) Soó 1927 em. Pignatti 1953 – вузкалістапухоўкавая
	Ас. 3. Sagittario-Sparganietum emersi R. Тх. 1953 – стрэлкалістава-плавальнаплюшчаевая
	Ас. 4. Eleocharidetum palustris (Šennikov 1919) Ubrizsy 1948 – балотнабалотніцавая
	Ас. 5. Equisetetum limosi Steffen 1931 em. Wilczek 1935 em. Matuszkiewicz 1984 – багнавахвашчовая
	Ас. 6. Phragmitetum communis (Koch 1926) Gams 1927 em. Schmale 1939 – трысняговая
	Ас. 7. Typhetum latifoliae Soó 1927 em. G. Lang 1973 – шыракалістапухоўкавая
	Ас. 8. Acoretum calami (Domin 1923) Egglер em. Schulz 1941 – аеравая
	Ас. 9. Glycerietum aquaticae Hueck 1931 – воднаманнікавая
24	<b>Клас 8. Scheuchzerio-Caricetea fuscae Nordh. 1936 em. Br.-Bl. et Тх. 1943 – ацыдафільныя супольніцтвы травяных балот</b>
24В	Ворда 1. Caricetalia fuscae Koch 1926 em. Nordhagen 1936 em. Br.-Bl. 1949
24В03	Уніён 1. Caricion fuscae Koch 1926 em. Klika 1934
	Ас. 1. Equisetetum palustri Stepanovič 2000 – балотнавахвашчовая
	Ас. 2. Juncetum filiformis R. Тх. 1937 – ніткаватасітовая
	Ас. 3. Caricetum fuscae Br.-Bl. 1915 em. Koch 1926 – чорнаасакавая

	Ас. 4. Agrostidetum caninae (R. Tx. 1937) Stepanovič 2000 – сабачамятліцавая
	Ас. 5. Caricetum canescentis Dohnal et al. 1965 – шэраватаасаковая
	Ас. 6. Eriophoretum polystachii (Domin 1923) Otruba (1945) 1947 – шматкаласковападвеевая
	Ас. 7. Caricetum juncellae Mirkin et al. 1992 – сітковаасаковая
24C	Ворда 2. Scheuchzerietalia palustris Nordhagen 1936
24C01	Уніён 1. Caricion lasiocarpae Van den Bergh. in Lebrun et al. 1949
	Ас. 1. Caricetum diandrae Jonas (1932) 1933 em. Oberdorfer 1957 – двухтычынкаваасаковая
	Ас. 2. Calamagrostidetum neglectae Торпа 1956 – непрыкметнапажарніцавая
	Ас. 3. Caricetum lasiocarpae (Osvald 1923) Koch 1926 em. Klika 1935 – валосістаплоднаасаковая
24C02	Уніён 2. Rhynchosporion albae Koch 1926
	Ас. 1. Caricetum limosae (Paul 1910) Br.-Bl. 1921 em. Klika 1935 – багнаваасаковая
	Ас. 2. Caricetum chordorrhizae Paul et Lutz 1941 – бізунаватаасаковая
25	<b>Клас 9. Охусоссо-Sphagnetea (magellanici) Br.-Bl. et R. Tx. 1943 – супольніцтвы вярховых і пераходных балот</b>
25A	Ворда 1. Erico-Ledetalia palustris (Nordh. 1936) R. Tx. 1937*
25A03	Уніён 1. Охусоссо-Ericion tetralicis (Nordh. 1936) R. Tx. 1937 em. Moore 1968
	Ас. 1. Empetro-Sphagnetum fuscii Du Rietz 1921 em. Dierßen 1980 – вадзяніцава-сфагнавая
	Ас. 2. Охусоссо-Callunetum Schubert 1960 – журавінава-верасовая
25B	Ворда 2. Sphagnetalia medii Kästner et Flössner 1933
25B01	Уніён 1. Eriophorion vaginati Krajina 1933 (Sphagnion magellanici Kästner et Flössner 1933 em. Dierss. 1975)
	Ас. 1. Eriophoretum vaginati (Hueck 1925) Stepanovič 2000 – пахвенавападвеевая
25B02	Уніён 2. Sphagnion medii Kästner et Flössner 1933
	Ас. 1. Sphagnetum magellanici Kästner et Flössner 1933 – магелланска-сфагнавая
25C	Ворда 3. Sphagno-Betuletalia pubescentis Lohmeyer et R. Tx. in Scamoni et Passarge 1959*
25C01	Уніён 1. Betulion pubescentis Lohmeyer et R. Tx. 1955
	Ас. 1. Betuletum pubescentis R. Tx. (1937) 1955 – пушыстабярозавая
	Ас. 2. Pino-Ledetum palustris R. Tx. 1955 – хваёва-багуновая
26	<b>Клас 10. Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937 – супольніцтвы сапраўдных (эўмезафільных) і сырых лугоў</b>
26B	Ворда 1. Arrhenatheretalia (elatoris) Pawłowski (1926) 1928
26B01	Уніён 1. Arrhenatherion elatoris (Br.-Bl. 1925) Koch 1926
	Ас. 1. Arrhenatheretum elatoris (Br.-Bl. 1915) Scherrer 1925 – высокарайграсавая
	Ас. 2. Festucetum rubrae (Domin 1923) Válek 1956 em. Pukau et al. 1956 – чырвонамурожніцавая
	Ас. 3. Brometum mollis (de Foucault 1989) Stepanovič 2000 – мяккабромусавая
	Ас. 4. Helictotrichonetum pubescentis (de Leeuw 1936) Stepanovič 1999 – пушыстааўсяцовая
	Ас. 5. Brizetum mediae Stepanovič 2000 – дрыжнікавая
26B02	Уніён 2. Cynosurion cristati Br.-Bl. et R. Tx. 1943 em. R. Tx. 1947

	Ас. 1. Cynosuretum cristati (R. Tx. 1937) R. Tx. ap Bukker 1942 – грэбнікавая
	Ас. 2. Trifolietum repentis Shvergunova et al. 1984 – паўзучаканюшынавая
	Ас. 3. Lolietum perenni (Domin 1930) Stepanovič 2000 – шматгадоважыцікавая
	Ас. 4. Dactylidetum glomeratae Jenik et al. 1980 em. Stepanovič (1987) 2000 – купкоўкавая
	Ас. 5. Phleetum pratensi Stepanovič 2000 – лугавацімафееўкавая
	Ас. 6. Trifolietum pratensi Stepanovič 2000 – лугаваканюшынавая
	Ас. 7. Poetum pratensis Stepanovič 2000 – лугаваметлюжковая
	Ас. 8. Festucetum pratensis Soó 1938 – лугавамурожніцавая
26D	Ворда 2. Galietalia veri Mirkin et Naumova 1986
26D04	Уніён 1. Trifolion montani (Preising 1949)
	Ас. 1. Poetum angustifoliae (Domin 1943) Schelyag-Sosonko et al. 1986 – вузкалістаметлюжковая
	Ас. 2. Trifolietum montani Mirkin et al. 1983 em. Shvergunova et al. 1984 – горнаканюшынавая
	Ас. 3. Galietum veri Shvergunova et al. 1984 – сапраўднамарунавая
26E	Ворда 3. Holoschoenetalia Br.-Bl. (1931) 1947
26E05	Уніён 1. Sieglingion decumbentis Gamisans 1976
	Ас. 1. Sieglingietum decumbentis Stepanovič (1987) 1991 – зіглінгіевая
	Ас. 2. Anthoxantheum odorati Kmoniček 1934 – духмянакаласковая
26F	Ворда 4. Molinietalia (coeruleae) Koch 1926
26F01	Уніён 1. Alopecurion pratensis Passarge 1964
	Ас. 1. Alopecuretum pratensis (Regel 1925) Steffen 1931 – лугавабатлачыкавая
	Ас. 2. Poetum trivialis (Soó 1938) Stepanovič 2000 – звычайнаметлюжковая
	Ас. 3. Poetum palustris Resmerita et Ratiu 1974 – балотнаметлюжковая
	Ас. 4. Agrostidetum albae (Savič 1926) Michalko et Petráňová 1967 – беламятліцавая
26F05	Уніён 2. Deschampsion caespitosae Horvatič 1930
	Ас. 1. Festucetum arundinaceae (Jílek et Velíšek 1963) Stepanovič 2000 – трысняговамурожніцавая
	Ас. 2. Deschampsietum caespitosae (Klika 1925) Horvatič 1930 – дзірваніставострыцавая
	Ас. 3. Juncetum effusi (Pauca 1941) Soó 1947 – разгалістасітовая
	Ас. 4. Juncetum conglomerati (Válek 1962) Stepanovič 2000 – скучанасітовая
26F06	Уніён 3. Filipendulion ulmariae (Br.-Bl. 1947) Lohm. ap. Oberd. et al. 1967 em. Balátová-Tuláčková 1978
	Ас. 1. Filipenduletum ulmariae Shvergunova et al. 1984 – вязаліставятроўнікавая
	Ас. 2. Polygonetum bistortae (Tx. 1951) Stepanovič 2000 – змяінадрасёнавая
	Ас. 3. Caricetum caespitosae (Steffen 1931) Klika et Šmarda 1941 em. Palczewski 1975 – дзірваністаасакавая
	Ас. 4. Calamagrostidetum canescentis Březina et al. 1963 em. Peciar 1967 – шэраватапажарніцавая
26F10	Уніён 4. Molinion (coeruleae) Koch 1926
	Ас. 1. Molinietum coeruleae Koch 1926 – малініевая
	Ас. 2. Caricetum echinatae Stepanovič (1987) 2000 – вожыкавакалючаасакавая



	Ас. 3. Caricetum paniceae Šmarda 1951 – прасянаасаковая
	Ас. 4. Caricetum flavae (Novacký 1946) Šmarda 1950 – жоўтаасаковая
28	<b>Клас 11. Festuco-Brometea (erecti) Br.-Bl. et R. Tx. 1943 – астэпаваныя (ксератэрмныя) лугавыя супольніцтвы</b>
28C	Ворда 1. Brometalia erecti Br.-Bl. 1936
28C02	Уніён 1. Bromion erecti Br.-Bl. et Moor 1938
	Ас. 1. Caricetum praecocis (R. Tx. ex Walther 1977) Stepanovič 2000 – раннеасаковая
	Ас. 2. Bromopsidetum inermis (Podpěra 1928) Shvergunova et al. 1984 – безасцюковакаласняцовая
28I	Ворда 2. Koelerio-Phleetalia phleoidis Korneck 1974
28I02	Уніён 1. Koelerio-Phleion phleoidis (Domin 1928) Korneck 1974
	Ас. 1. Phleetum phleoidis Podpěra 1928 – стэпавацімафееўкавая
	Ас. 2. Festucetum polesicae (Regel 1928) Stepanovič 2000 – палескамурожніцавая
28J	Ворда 3. Poо-Agrostietalia vinealis Shelyag-Sosonko, V. Sl. et Sipaylova 1985
28J02	Уніён 1. Agrostion vinealis Sipaylova et al. 1985
	Ас. 1. Koelerietum delavignei Stepanovič 1997 – дэлявінекелерыева
	Ас. 2. Agrostietum vinealis Shelyag-Sosonko et al. 1986 – вінаграднікавамятліцавая
	Ас. 3. Hierochloetosum odoratae Stepanovič 2000 – духмяназуброўкавая
29	<b>Клас 12. Koelerio-Corynephoretea Klika in Klika et Novák 1941 – супольніцтвы травяных пустак з расходнікамі й галадком</b>
29C	Ворда 1. Corynephoretalia (canescentis) Klika (1931) 1934
29C02	Уніён 1. Corynephorion canescentis Klika 1931
	Ас. 1. Corynephoretum canescentis (Juraszek 1928) Steffen 1931 – булаваносцавая
29D	Ворда 2. Festuco-Sedetalia R. Tx. 1951
29D01	Уніён 1. Koelerion glaucae Volk 1931 em. Klika (1935) 1939
	Ас. 1. Koelerietum glaucae Šmarda 1953 em. Stepanovič (1987) 1988 – шызакакелерыева
29D02	Уніён 2. Plantagini-Festucion ovinae Passarge 1964
	Ас. 1. Calamagrostidetum epigeji (Domin 1929) Klika 1931 – наземнапажарніцавая
	Ас. 2. Festucetum ovinae (Suza 1930) Klika 1954 em. Schelyag-Sosonko et al. 1985 – авечамурожніцавая
29F	Ворда 3. Sedo-Scleranthetalia (biennis) Br.-Bl. 1955
29F01	Уніён 1. Hyperico perforati-Scleranthion perennis Moravec 1967
	Ас. 1. Helichryso-Jasionetum Libb. 1940 – цмена-букашнікавая
30	<b>Клас 13. Calluno-Ulicetea (Quantin 1935) R. Tx. 1937 – верасова-сіўцовыя супольніцтвы на папялістых глебах</b>
30A	Ворда 1. Nardetalia (strictae) Oberdorfer 1949 em. Preising 1949
30A03	Уніён 1. Equiseto-Galion borealis (R. Tx. et Bötscher 1969)
	Ас. 1. Galietum boreali (R. Tx. et Bötscher 1969) ass. nova – паўночнамарунавая
30A05	Уніён 2. Nardo-Agrostion tenuis Sillinger 1933
	Ас. 1. Nardetum strictae (Domin 1923) Knapp 1945 – сіўцовая
	Ас. 2. Agrostidetum vulgaris Szafer et al. 1927 em. Hueck 1931 – звычайнамятліцавая

30C	Ворда 2. Vaccinio-Genistetalia Schubert 1960*
30C03	Уніён 1. Genisto-Vaccinion Br.-Bl. 1926 p. p.
	Ас. 1. Callunetum vulgaris Domin (1928) 1929 – верасовая
	Ас. 2. Scabioso canescentis-Genistetum tinctoriae Balcerkiewicz et Brzeg 1993 ex Brzeg et M. Wojternska 2001 – скабіёза-фарбавальнажаўтазелевая
	Ас. 3. Sarothamnetum scoparii Susplugas (1935) 1942 – жарнаўцовая
	Ас. 4. Vaccinio-Callunetum Bük. 1942 em. Schubert 1960 – бруснічна-верасовая
31	<b>Клас 14. Trifolio-Geranietea sanguinei Müller 1961 – ксератэрмныя супольніцтвы узлескаў</b>
31A	Ворда 1. Melampyro-Holcetalia Passarge 1967
31A02	Уніён 1. Melampyrion pratensis Passarge 1967
	Ас. 1. Stachyo-Melampyretum nemorosi Passarge 1967 – чысцікава-дуброўнабратаўкавая
31B	Ворда 2. Origanetalia vulgaris Müller 1961
31B04	Уніён 1. Trifolion medii Müller 1961
	Ас. 1. Trifolietum medii Müller 1961 em. Stepanovič (1987) 1991 – сярэднеканюшынаявая
	Ас. 2. Equisetetum hyemali ass. nova – зімавальнахвашчовая
53	<b>Клас 15. Salicetea purpureae Moor 1958 – супольніцтвы прырэчнага вербалозу*</b>
53A	Ворда 1. Salicetalia purpureae Moor 1958
53A01	Уніён 1. Rubo caesii-Amorphion fruticosae Shevehyk et V. Sl. 1996
	Ас. 1. Salicetum acutifoliae Pulgar et al. 1996 – востраліставербавая
53A02	Уніён 2. Salicion albae Soó 1930 em. R. Tx. 1955 em. Müller et Görs 1958
	Ас. 1. Salicetum triandro-viminalis Lohmeher 1952 – трохтычынкава-кошыкававербавая
	Ас. 2. Salicetum purpureae Wendelberger-Zelinka 1952 em. Moor 1958 – пурпуровавербавая
	Ас. 3. Salicetum albae Issler 1926 em. Oberdorfer 1953 em. Müller et Görs 1958 – белавербавая
	Ас. 4. Salicetum fragilis Passarge 1957 – ломкавербавая
53A06	Уніён 3. Salicion triandrae Müller et Görs 1958
	Ас. 1. Salicetum triandrae Malcuit 1929 – трохтычынкававербавая
	Ас. 2. Salicetum myrsinifoliae (Mazan in Parfenov et Mazan 1986) ass. nova – мірзіналіставербавая
54	<b>Клас 16. Populetea albae Br.-Bl. 1962 – шэраальховыя, ясеневыя й таполевыя супольніцтвы*</b>
54A	Ворда 1. Fraxinetalia Scamoni et Passarge 1959
54A01	Уніён 1. Alnion incanae Pawłowski 1928
	Ас. 1. Alnetum incanae Lüdi 1921 em. Aichinger et Siegr. 1930 – шэраальховая
	Ас. 2. Urtico dioicae-Fraxinetum excelsiori Oberdorfer 1953 – крапіўна-ясеневая
	Ас. 3. Carici remotae-Fraxinetum (excelsiori) Koch 1926 – рассунутаасакова-ясеневая
54B	Ворда 2. Populetea (albae) Br.-Bl. 1931 em. Br.-Bl. ex Tchou 1948
54B03	Уніён 1. Populion albae Br.-Bl. 1931 em. Br.-Bl. ex Tchou 1948
	Ас. 1. Populetum albae Br.-Bl. 1931 – белатаполевая

	Ас. 2. Salici (albae)-Populetum nigrae (R. Tx. 1931) Meyer-Drees 1936 – белавербавачорнатаполевая
55	<b>Клас 17. Alnetea glutinosae Br.-Bl. et R. Tx. 1943 em. Müller et Görs 1958 – супольніцтвы чорнаальховых лясоў*</b>
55A	Ворда 1. Alnetalia glutinosae R. Tx. 1937 em. Müller et Görs 1958
55A01	Уніён 1. Alnion glutinosae Malcuit 1929 em. Meijer Drees 1936
	Ас. 1. Urtico-Alnetum glutinosae (Scamoni 1935) Fukarek 1961 – крапіўна-чорнаальховая
	Ас. 2. Filipendulo ulmariae-Alnetum glutinosae (Lemée 1937) Rameau 1994 – вязаліставятроўнікава-чорнаальховая
	Ас. 3. Ribo nigri-Alnetum (glutinosae) Sol.-Görn. 1975 – чорнапарэчкава-чорнаальховая
	Ас. 4. Carici elongatae-Alnetum (glutinosae) Koch 1926 ex R. Tx. 1937 em. Bod. 1955 – падоўжанаасакова-чорнаальховая
	Ас. 5. Sphagno-Alnetum glutinosae Lemée 1937 – сфагнава-чорнаальховая
	Ас. 6. Hottonio-Alnetum glutinosae Hueck 1929 – вадаперыцава-чорнаальховая
	Ас. 7. Alno (glutinosae)-Betuletum (pubescentis) Scamoni 1959 – чорнаальхова-пушыстабярзавая
56	<b>Клас 18. Franguletea Doing 1962 – супольніцтвы ацыдафільных балотных хмызнякоў</b>
56B	Ворда 1. Salicetalia auritae Doing 1962
56B01	Уніён 1. Salicion cinereae Müller et Görs ex Passarge 1961
	Ас. 1. Molinio-Salicetum rosmarinifoliae Magyar ex Soó 1933 – малініева-размарыналіставербавая
	Ас. 2. Salicetum pentandro-cinereae (Almquist 1929) Passarge 1961 – пяцітычынкава-попелнашэравербавая
	Ас. 3. Salicetum auritae Jonas 1935 – вушаставербавая*
	Ас. 4. Betuletum humilis Fijałkowski 1959 – прысадзістабярзавая
58	<b>Клас 19. Rhamno-Prunetea Br.-Bl. et R. Tx. 1943 em. Müller et Görs 1958 – супольніцтвы ксератэрмных хмызнякоў*</b>
58A	Ворда 1. Prunetalia spinosae R. Tx. 1952
58A04	Уніён 1. Carpino-Prunion (R. Tx. 1952) Weber 1974
	Ас. 1. Carpino-Prunetum (spinosae) R. Tx. 1952 – грабава-цярновая
	Ас. 2. Rubo-Coryletum (avellanae) Oberdorfer 1957 – ажынава-арэшнікавая
59	<b>Клас 20. Quercu-Fagetea (silvatica) Br.-Bl. et Vlieger 1937 em. Klika 1939 – супольніцтвы шыракалістых і асінавых лясоў*</b>
59A	Ворда 1. Betulo pendulae-Populetalia tremulae Rivas-Martínez et Costa 2002
59A03	Уніён 1. Corylo-Populion tremulae Br.-Bl. 1961 em. Rivas-Martínez et Costa 1998
	Ас. 1. Rubo saxatilis-Populetum tremulae Korotkov 1986 – касцяніцава-асінавая
59B	Ворда 1. Fagetalia silvaticae Pawłowski in Pawł., Sokoł., Wallisch 1928
59B04	Уніён 1. Carpinion betuli Issler 1931 em. Mayer 1937 em. Oberdorfer 1953
	Ас. 1. Tilio (cordatae)-Carpinetum (betuli) Traczyk 1962 – ліпава-грабавая
	Ас. 2. Quercu (robori)-Carpinetum (betuli) Scamoni 1963 – дубова-грабавая
	Ас. 3. Oxalido-Carpinetum betuli ass. nova – кісліцава-грабавая
59B18	Уніён 2. Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani Klika 1955
	Ас. 1. Aceri (platanoides)-Tilietum (cordatae) Faber 1936 – клянова-ліпававая

61	<b>Клас 21. Quercetea roboris Br.-Bl. et Vlieger 1937 em. Klika 1939 – супольніцтвы дуброў*</b>
61B	Ворда 1. Quercetalia roboris R. Tx. 1931 ex R. Tx. 1937 em. Rivas-Martínez 1973
61B03	Уніён 1. Convallario majalis-Quercion roboris (Quercion roboris-petraeae Br.-Bl. 1931)
	Ас. 1. Agrostio (vulgaris)-Quercetum (roboris) Passarge 1953 – звычайнамятліцава-дубовая
	Ас. 2. Convallario majali-Quercetum robori Shevehyk et V. Sl. in Shevehyk et al. 1996 – ландышава-дубовая
61B04	Уніён 2. Dicrano-Quercion (Quercion roboris Malcuit 1929)
	Ас. 1. Trollio europaei-Quercetum roboris Korotkov 1986 – пярэснава-дубовая
	Ас. 2. Carici digitatae-Quercetum roboris ass. nova – пальчатаасакова-дубовая
61B09	Уніён 4. Quercion roboris Malcuit 1929
	Ас. 1. Pteridio aquilini-Quercetum robori Bajrak 1996 – арлякова-дубовая
	Ас. 2. Vaccinio myrtilli-Quercetum roboris P. Silva et al. 1950 – чарнічна-дубовая
	Ас. 3. Oxalido-Quercetum roboris ass. nova – кісліцава-дубовая
	Ас. 4. Dryopterido-Quercetum roboris ass. nova – папарацева-дубовая
64	<b>Клас 22. Pyrolo-Pinetea Korneck in Oberd. et al. р. р. – супольніцтвы барэальных хваёвых лясоў*</b>
64B	Ворда 1. Festuco-Pinetalia sylvestris Oberdorfer 1949
64B01	Уніён 1. Cytiso ruthenici-Pinion (sylvestris) Krausch 1962
	Ас. 1. Corynephero-Pinetum sylvestris (Jurazek 1928) Hofmann 1964 – булаваносцава-хваёвая
	Ас. 2. Koelerio glaucae-Pinetum sylvestris (Steffen 1931) Krausch 1962 – шызакелерыева-хваёвая
	Ас. 3. Pino sylvestris-Juniperetum communis ass. nova – хваёва-ядлоўцавая
	Ас. 4. Pyrolo-Pinetum (sylvestris) (Libbert 1933) E. Schmidt 1936 – ігрушанкава-хваёвая
	Ас. 5. Cladonio-Pinetum (sylvestris) Jurazek 1927 – кладоніева-хваёвая
64B02	Уніён 2. Festuco vaginatae-Pinion (sylvestris) Soó 1971
	Ас. 1. Peucedano-Pinetum (sylvestris) J. Matuszkiewicz (1962) 1973 – горнапятрушкава-хваёвая
	Ас. 2. Convallario-Pinetum sylvestris ass. nova – ландышава-хваёвая
	Ас. 3. Pleurozio schreberi-Pinetum (sylvestris) cult. Šomšáková 1988 – плеўрозіева-хваёвая
	Ас. 4. Vaccinio vitis-idaeae - Pinetum (sylvestris) Sokołowski 1980 – бруснічна-хваёвая
66	<b>Клас 23. Vaccinio-Piceetea (abietis) Br.-Bl. in Br.-Bl., Sissingh et Vlieger 1939 – супольніцтвы барэальных пераважна яловых лясоў*</b>
66C	Ворда 1. Piceetalia excelsae Pawłowski in Pawł. et al. 1928
66C01	Уніён 1. Dicrano-Pinion (silvestris) (Libbert 1933) Wł. Matuszkiewicz 1962 em Oberdorfer 1979
	Ас. 1. Pteridio-Pinetum (sylvestris) Andrienko 1986 – арлякова-хваёвая
	Ас. 2. Serratulo-Pinetum (sylvestris) J. Matuszkiewicz 1981 – сярпухава-хваёвая
	Ас. 3. Querco roboris-Pinetum (sylvestris) J. Matuszkiewicz 1981 – дубова-хваёвая
	Ас. 4. Betuletum pendulae (Baliavičėnė 1988) – барадаўчатабярозавая
	Ас. 5. Pineto (sylvestris)-Vaccinietum myrtilli (Kobendza 1930) Br.-Bl. et Vlieger 1939 – хваёва-чарнічная

	Ас. 6. Leucobryo (glauci)-Pinetum (sylvestris) Wł. Matuszkiewicz (1962) 1973 – леўкабрыева-хваёвая
	Ас. 7. Molinio (coeruleae)-Pinetum (sylvestris) (J. Matuszkiewicz 1973) Matuszkiewicz 1984 – малініева-хваёвая
66C02	Уніён 2. Piceion excelsae Pawłowski in Pawł. et al. 1928
	Ас. 1. Quercu (robori)-Piceetum (abies) Wł. Matuszkiewicz 1952 em. Matuszkiewicz et Pol. 1955 – дубова-яловая
	Ас. 2. Eu-Piceetum (abies) Caj. 1921 em. K. Lund 1967 – яловая
	Ас. 3. Betulo pubescentis-Piceetum (abies) Sokołowski 1980 – пушыстабярэзава-яловая
	Ас. 4. Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris (Hueck. 1925) Kleist 1929 – буякова-хваёвая
67	<b>Клас 24. Stellarietea mediae (Br.-Bl. 1931) R. Tx., Lohmeyer, Preising 1950 – ворыўныя супольніцтвы малагадовых пустазельных траў*</b>
67A	Ворда 1. Atriplici-Chenopodietalia albi (R. Tx. 1937) Nordhagen 1940
67A06	Уніён 1. Scleranthion annuae (Kruseman et Vlieger 1939) Vlieger 1946
	Ас. 1. Scleranthetum annui (Soó 1961) Gamar et al. 1985 – аднагадовагаладкавая
	Ас. 2. Galeopsio tetrahit-Sperguletum arvensis Passarge in Pass. et Jurko 1975 – звычайназяберава-полесвінакропавая
67B	Ворда 2. Centauretalia cyani R. Tx. (1943) 1950
67B06	Уніён 1. Papaverion rhoeadis V. Sl. 1987
	Ас. 1. Centaureo-Aperetum spicae-venti V. Sl. (1987) 1989 – сіневалашкава-метліцавая
	Ас. 2. Vicietum angustifoliae-hirsutae Nowiński 1964 – вузкаліставалосістагарошкая
67D	Ворда 3. Eragrostietalia J. Tx. 1961
67D01	Уніён 1. Amarantho-Chenopodion (rubri) (J. Tx. 1960) (Amarantho blitoidi-Echinochloion crusgalli V. Sl. 1988)
	Ас. 1. Galeopsidetum speciosae Krusem et Vlieger 1939 – фарбавальназяберавая
67D05	Уніён 2. Matricario chamomillae-Chenopodion albi (Panico-Setarion Sissingh 1946)
	Ас. 1. Matricarietum perforatae Керцыўска 1975 – прадзіраўленарамонкавая
	Ас. 2. Chenopodietum albi-viride (Br.-Bl. 1921) Hejný 1979 – бела-зялёналебядовая
	Ас. 3. Setario-Galinsogetum R. Tx. 1950 – мяшэева-галінзогавая
	Ас. 4. Malvetum pusillae Morariu 1943 – маленькамальвовая
67E	Ворда 4. Sisymbrietalia J. Tx. 1961
67E05	Уніён 1. Sisymbriion officinalis R. Tx., Lohmeyer, Preising in R. Tx. 1950 em. Hejný et al. 1979
	Ас. 1. Sisymbrietum loeselii Gutte (1969) 1972 – лёзэлегуляўнікавая
	Ас. 2. Stellarietum mediae Hadač 1969 – сярэднезоркаўкавая
	Ас. 3. Polygonetum lapathifolii (Felföldy 1943) Soó 1961 – разгалістадрасёнавая
68	<b>Клас 25. Polygono-Poetea annuae Rivas-Martinez 1975 – прыдарожныя супольніцтвы, падвергнутыя вытаптаванню</b>
68A	Ворда 1. Polygono arenastri-Poetalia annuae R. Tx. in Géhu, Richard et R. Tx. 1972
68A01	Уніён 1. Matricario-Polygonion avicularis Rivas-Martinez 1975
	Ас. 1. Poetum annuae Gams 1927 em. Knapp 1948 – аднагадоваметлюжковая
	Ас. 2. Polygonetum avicularis Gams 1927 em. Knapp 1945 em. Jehlik in Hejný et al. 1979 – птушынадрасёнавая

	Ас. 3. Lolio (perennis)-Plantaginetum majoris Beger 1930 – пашаварайграсава-вялікатрыпутнікавая
	Ас. 4. Polygono-Matricarietum matricarioidis (Sissingh 1969) R. Tx. R. Tx. in Géhu, Richard et R. Tx. 1972 – птушынадрасёнава-пахучарамонкавая
	Ас. 5. Potentilletum anserinae Rapaics 1927 em. Passarge 1964 – гусінадуброўкавая
69	<b>Клас 26. Artemisietea vulgaris Lohmeyer, Preising et R. Tx. in R. Tx. 1950 em. Kopecký in Hejný et al. 1979 – травяныя супольніцтвы аблогаў і парушаных земляў</b>
69B	Ворда 1. Agropyretalia repentis Oberdorfer et al. 1967
69B04	Уніён 1. Convolvulo arvensis-Agropyron repentis Görs 1966
	Ас. 1. Artemisietum absinthii Schubert et Mahn. 1959 ex Elias 1982 – горкапальыная
	Ас. 2. Convolvulo arvensis-Agropyretum repentis Felföldy 1943 – полебярозкава-паўзучапырнікавая
	Ас. 3. Lupinetum polyphylli Stepanovič (1987) 2000 – шматлісталубінавая
	Ас. 4. Cirsietum arvensi-lanceolati Mititelu 1972 – поле-звычайнабадзяковая
	Ас. 5. Sonchetum arvensis (Passarge in Pass. et Jurko 1975) Jarolímek et al. 1997 – полеасотавая
69D	Ворда 2. Onopordetalia acanthii Br.-Bl. et R. Tx. 1943
69D01	Уніён 1. Arction (lappae) (Tx. 1937) Sissingh 1946 em. Gutte 1972
	Ас. 1. Artemisietum vulgaris R. Tx. 1942 em. Knapp 1945 em. Toběrná 1969 – звычайнапальыная
	Ас. 2. Arctietum lappae Felföldy 1942 – вялікалопухавая
	Ас. 3. Heracleetum sosnowskyi Stepanovič 2000 – сасноўскабаршчэўнікавая
69D04	Уніён 2. Dauco-Melilotion Görs 1966 em. Elias 1980
	Ас. 1. Echio-Melilotetum albi R. Tx. (1942) 1947 – сінякова-белабаркуновая
	Ас. 2. Melilotetum officinalis (Sissingh 1950) – лекавабаркуновая
	Ас. 3. Artemisio-Tanacetetum vulgari Br.-Bl. 1931 em. Stepanovič 2000 – пальына-піжмавая
70	<b>Клас 27. Galio-Urticetea Passarge ex Kopecký 1969 em. Müller in Oberdorfer 1983 – супольніцтвы засмечаных земляў</b>
70B	Ворда 1. Convolvuletalia sepium R. Tx. 1950
70B02	Уніён 1. Cynancho-Convolvulion sepium Rivas Goday et Rivas-Martínez 1963
	Ас. 1. Calystegietum sepium (Hilbig 1972) Stepič 1984 – плотвапавітухавая
70D	Ворда 2. Lamio albi-Chenopodietalia boni-henrici Kopecký 1969
70B02	Уніён 1. Aegopodion podagrariae R. Tx. 1967 em. Neuhäuslová-Novotná, Neuhäusl et Hejný 1969
	Ас. 1. Anthriscetum sylvestris Hadač 1978 – лесамаркоўнікавая
	Ас. 2. Petasitetum spurii Passarge 1964 – несапраўднабелакапытнікавая
70D05	Уніён 2. Carduo-Urticion dioicae Hadač 1962
	Ас. 1. Urticetum dioicae (Domin 1944) Šmarda et al. 1963 – двухдомнакрапіўная
71	<b>Клас 28. Epilobietea angustifolii R. Tx. et Prsg. in R. Tx. 1950 – супольніцтвы лясных высечак і гараў*</b>
71A	Ворда 1. Atropetalia Vlieger 1937
71A03	Уніён 1. Carici piluliferae-Epilobion angustifolii Rübél 1933
	Ас. 1. Epilobietum angustifolii Soó 1934 em. Šmarda 1963 – вузкалістакіпрэзевая
	Ас. 2. Rubetum idaei Klika 1955 em. Hadač et Smola 1962 – малінавая

	Ас. 3. Rubetum caesius Klika 1955 – ажынавая
	Ас. 4. Valeriano-Fragarietum vescae O. Bolòs 1977 – валяр’янава-лесасунічная
72	<b>Клас 29. Bidentetea tripartiti R. Тх., Lohmeyer et Preising in R. Тх. 1950 – супольніцтвы на багатых ілістых мокрых глебах</b>
72A	Ворда 1. Bidentetalia tripartiti Br.-Bl. et R. Тх. 1943
72A01	Уніён 1. Bidentetion tripartiti Nordhagen (1939) 1940
	Ас. 1. Bidentetum tripartiti Koch 1926 em. Libbert 1932 – трохпадзельнаваўчковая
	Ас. 2. Myosuretum minimi (Diemont et al. 1940) R. Тх. 1950 – мышахвоснікавая
72A02	Уніён 2. Chenopodion rubri J. Тх. in Poli et J. Тх. 1960 corr. Kopecký 1969*
	Ас. 1. Chenopodietum rubri Timar 1950 – чырвоналебядовая

Заўвагі: 1 – супольніцтвы, пералік якіх папярэдні, пазначаны \*;

2 – з улікам адсутнасці дакладных літаратурных звестак назовы некаторых супольніцтваў дадзены без аўтарства.

**Вынікі й іх абмеркаванне.** Згодна з прадромусам (гл. табл. 2) біразнастайнасць расліннасці Беларусі прадстаўлена 232 асацыяцыямі супольніцтваў, аднесены да 78 уніёнаў (саюзаў), 49 вордаў (парадкаў) і 29 класаў. Сярод прыроднай расліннасці па колькасці асноўных адзінак (асацыяцый) першынствуюць класы *Molinio-Arrhenatheretea* – супольніцтвы сапраўдных (эўмезафільных) і сырых лугоў (34 асацыяцыі) і *Phragmito-Magnocaricetea* – балоцістыя травяныя супольніцтвы (26 асацыяцый). За імі крочаць класы *Potametea* – супольніцтвы прэсनावодных вадаёмаў (16 асацыяцый); *Scheuchzerio-Caricetea fuscae* – ацыдафільныя супольніцтвы травяных балот (12 асацыяцый); *Vaccinio-Piceetea* – супольніцтвы барэальных пераважна яловых лясоў (11 асацыяцый), куды ўваходзяць мезафільныя хвойнікі й бярэзнікі; *Pyrolo-Pinetea* – супольніцтвы барэальных хваёвых лясоў (9 асацыяцый).

Супольніцтвы большыні класаў распаўсюджаны нязначна па плошчы й радзей: *Quercetea roboris* – супольніцтвы дуброў (8 асацыяцый); *Calluno-Ulicetea* – верасова-сіўцовыя супольніцтвы на папялістых глебах (7 асацыяцый); *Alnetea glutinosae* – супольніцтвы чорнаальховых лясоў (7 асацыяцый); *Salicetea purpureae* – супольніцтвы прырэчнага й прыдарожнага вербалозу (7 асацыяцый); *Festuco-Brometea* – астэпаваныя (ксератэрмныя) лугавыя супольніцтвы (7 асацыяцый); *Lemnetea* – супольніцтвы плавальных раслін (6 асацыяцый); *Oxycocco-Sphagnetea* – супольніцтвы вярховых і пераходных балот (6 асацыяцый); *Koelerio-Corynephoretea* – супольніцтвы травяных пустак з расходнікамі й галадком (5 асацыяцый); *Populetea albae* – шэраальховыя, ясеневыя й таполевыя супольніцтвы (5 асацыяцый); *Quercus-Fagetea* – супольніцтвы шыракалістых і асінавых лясоў (5 асацыяцый); *Festuco-Puccinellietea* – травяныя супольніцтвы на багатых працягла заліўных алювіяльных глебах (5 асацыяцый); *Franguletea* – супольніцтвы ацыдафільных балотных хмызнякоў (4 асацыяцыі); *Isoëto-Littorelletea* – супольніцтвы водмеляў (4 асацыяцыі). Адзінкавымі фітацэнозамі прадстаўлены класы *Honkenyo-Elymetea arenarii* – прыбярэжныя атлантычныя травяныя супольніцтвы (1 асацыяцыя); *Rhamno-Prunetea* –

супольніцтвы ксератэрмных хмызнякоў (2 асацыяцыі); *Montio-Cardaminetea* – крынічныя супольніцтвы (3 асацыяцыі), *Trifolio-Geranietea sanguinei* – ксератэрмныя супольніцтвы ўзлескаў (3 асацыяцыі) (гл. табл. 2). Цярновыя супольніцтвы класа *Rhamno-Prunetea* й пясчанакаласняковыя класа *Honkenyo-Elymetea arenarii* – вельмі рэдкія для Беларусі, якія маюць месца толькі ў басейне р. Буг.

На ўзроўні асацыяцый рэдкімі для Беларусі й Еўропы з'яўляюцца супольніцтвы шэрагу травяных: *Beckmannietum eruciformis*, *Caricetum echinatae*, *Caricetum juncellae*, *Eleocharidetum uniglumis*, *Festucetum polesicae*, *Hierochloetum odoratae*, *Juncetum atrati* й інш., – прапанаваных у якасці матэрыялу да будучай Зялёнай кнігі краіны [10].

Такая канцэнтраваная, у чымсьці асаблівая біразнастайнасць расліннага покрыва абумоўлена становішчам нашай краіны ў геаграфічным цэнтры еўрапейскага кантынента, дзе адбываецца актыўнае ўзаемапраціканненне немаральнай і барэальнай расліннасцяў [11].

**Заклучэнне.** Прыведзеная вышэй фітацэнатычная раскладка добра карэлюе з глебава-гідралагічнымі, араграфічнымі й занальна-геабатанічнымі умовамі краіны. Так, агульнае адрозненне паўночнай геабатанічнай падзоны – панаванне супольніцтваў барэальных пераважна яловых лясоў, супольніцтваў вярховых балот, прэснаводных вадаёмаў і сухадольных лугоў. Для паўднёвай падзоны характэрны супольніцтвы нізінных балот, поплаўных лугоў, барэальных хваёвых і шыракалістых лясоў. У цэнтральнай падзоне назіраецца спалучэнне хваёвых і яловых лясоў, сухадольных і поплаўных лугоў, перавага пераходных балот.

Трэба адзначыць, што ў сувязі з развіццём урбанізацыі, прамысловага, дарожнага й меліярацыйнага будаўніцтва адбылося рэзкае скарачэнне плошчаў, занятых прыроднай расліннасцю. За апошнія стагоддзі з тэрыторыі краіны знікла блізу 70 абарыгенных відаў раслін. Да катэгорыі знікальных аднесена 59 відаў [12]. Знікаюць цэлыя раслінныя супольніцтвы й экасістэмы, як напрыклад, травяныя нізінныя балоты. Спыніць гэты працэс можна толькі шляхам мэтанакіраванага рэгулявання ўсёй гаспадарчай дзейнасці ў краіне з улікам біялагічнай і экалагічнай разнастайнасці навакольнага асяроддзя. Сістэма фітасупольніцтваў і экатопаў – першааснова, на якой павінна грунтавацца ахова й рацыянальнае выкарыстанне прыродных рэсурсаў.

### Літаратура

1. Конвенция о биологическом разнообразии. Рио-де-Жанейро, 5 июля 1992 года / Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде. Мн., 1993. 32 с.
2. Скарбы прыроды Беларусі: Тэрыторыі, якія маюць міжнароднае значэнне для захавання біялагічнай разнастайнасці. – Treasures of Belarusian Nature: Areas of International Significance for Conservation of Biological Diversity / Пад агульнай рэд. А. В. Казуліна. Мн.: Беларусь, 2002. 160 с.



3. Ключевые ботанические территории Беларуси / Масловский О. М., Пронькина Г. А., Парфенов В. И., Пугачевский А. В., Третьяков Д. И., Степанович И. М. и др.; под ред. О. М. Масловского, Г. А. Пронькиной. М.–Мн.: Бестиор, 2005. 80 с.
4. Rodwell J. S., Schaminée J. H. J., Mucina L., Pignatti S., Dring J., Moss D. The Diversity of European Vegetation. An overview of phytosociological alliances and their relationships to EUNIS habitats. Wageningen: The Netherlands, 2002. 167 p.
5. Сцепановіч І. М. Эколага-фларыстычны дыягназ сінтаксонаў прыроднай травяністай расліннасці Беларусі. Мн.: “Камтат”, 2000. 140 с.
6. Сцепановіч І. М. // Весці АН Беларусі. Сер. біял. навук. № 2, 1994. С. 18–22
7. Сцепановіч І. М. Сінтаксанамія і сіндынаміка лугавой расліннасці Беларусі: Дыс. ...докт. біял. навук. Мінск, 1999. 775 с.
8. Сцепановіч Я. М. // Ботаника: Исследования. Вып. 33. Мн.: Право и экономика, 2005. С. 69–76
9. Сцепановіч Я. М. Трансект-метад як аснова маніторынгу раслінных экасістэм (з нямецкага досведу) // Міжнародны экалагічны досвед і яго выкарыстанне на Беларусі. Зборнік навуковых артыкулаў. International Environmental Experience: Applications for Belarus (collected papers) / Пад агульнай рэд. У. К. Слабіна. – Віцебск: ВФ УА ІСВ, 2003. С. 226–230
10. Сцепановіч Я. М. // Природные ресурсы, № 3, 2000. С. 16–27
11. Гельтман В. С. Географический и типологический анализ лесной растительности Белоруссии. Мн.: Наука и техника, 1982. 326 с.
12. Состояние и использование биологического разнообразия Республики Беларусь (Аналитический обзор) / Коорд. и научн. ред. Никифоров М. Е. Мн.: Центр “Конкордия”, 1998. 111 с.

### Summary

In view of the previous operating time and the analysis of the new geobotanical data collected by the author (in common more than 5 thousand descriptions) is made the prodromus of the highest syntaxonomic units of vegetation of Belarus, numbering 29 classes, 49 orders, 78 unions and 232 associations. Thus such integrated parameter of phytocommunities, as edificator dominants is used.