

Врождённые расщелины

верхней губы и нёба:


кормление детей раннего

возраста

ст. преподаватель кафедры логопедии

ИИО БГПУ им. М. Танка

Чипурко С. А.




Частота рождения детей с ВРГН

- По данным ВОЗ частота рождения детей с ВРГН в мире составляет 0,6-1,6 случая на 1000 новорожденных.
- В США отмечено колебание частоты этого порока:
 - от 0,78:1000 в штате Нью-Йорк ,
 - до 1.82:1000 на Гавайях,
 - 1.94:1000 в Алабаме
 - и даже до 2.5 на 1000 новорождённых в Нью-Мехико.


Частота рождения детей с ВРГН

- Россия 1,32 на 1000 новорождённых,
- Украина 1,3:1000,
- Япония 2:1000,
- Европейские страны - 1:1000,
- Африка - 0,2:1000,
- Беларусь - 0,7-0,8:1000.




Как кормить?

- ***Начинать нужно всегда с грудного вскармливания***
- ***Питание через соску***
- ***Кормление с ложки***
- ***Использование пластинок***




Для исключения аспирации содержимого полости рта или желудка (попадания в трахею) необходимо:

- **кормить ребёнка в полувертикальном положении;**
- **после кормления держать ребёнка в вертикальном положении (до получения отрыжки);**
- **в положении лёжа поворачивать головку набок.**




Начинать нужно всегда с грудного вскармливания

- При левосторонней расщелине считать оптимальным для ребенка положение, соответствующее позиции при кормлении правой грудью, а при правосторонней – наоборот.
- В этом случае нижняя половина молочной железы «закрывает» дефект, что делает возможным акт сосания.




Питание через соску

- обычная соска;
- увеличить отверстие в соске.
- Некоторых детей начинают кормить через обычную соску, а когда ребенок устает, заканчивают кормление, используя соску с большим отверстием.



Кормление с ложки

- новорожденный ребёнок укладывается на руках мамы **в полувертикальном положении** (приподнятая голова и верхняя часть туловища);
- набранное **в ложечку** сцеженное молоко или смесь по капелькам попадает на слизистую щеки ребёнка, и далее легко им глотается.
- В процессе кормления **обязательно** нужно контролировать глотание смеси или молока.



Использование пластинок

- В случае назначения раннего ортодонтического лечения для кормления ребенка могут изготовить индивидуальную специальную пластинку.

Мягкая ложечка SoftCup Для быстрого кормления слабых или недоношенных малышей

SoftCup — самый простой способ накормить малыша грудным молоком с помощью поильника. Его мягкая насадка в форме ложечки нежно ложится на нижнюю губу ребенка.



- **NUK Соска**
для детей с
расщелиной
верхней губы



РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Поильник

Special

Needs

(разработан для детей с расщелиной губы и неба, а также для детей с неврологическими заболеваниями)



- простая регулировка потока молока;
- легкое всасывание;
- никакого проливания;
- на кормление уходит меньше времени.