

# Асновы псіхapatалогіі

**ШКАЛА КОМЫ ГЛАЗГА**

# Шкала комы Глазга

- набор тэстаў для ацэнкі ступені парушэння свядомасці і комы дзяцей, старэйшых за 4 гады і дарослых. Дазваляе прагназаваць зыход пры нетраўматычнай коме

Складаецца з трох тэстаў, якія ацэньваюць

- рэакцыю адчынення вачэй (E)
- маўленчыя (V)
- рухальныя (M) рэакцыі.

За кожны тэст налічваецца пэўная колькасць балаў, якія сумуюцца. Мінімальная колькасць балаў – 3, максімальная – 15

# Распрацоўнікі шкалы комы Глазга

Шкалу апублікавалі ў 1974 годзе ў часопісу Lancet нейрахірургі  
Інстытута неўралогіі Універсітэта Глазга (Вялікабрытанія)  
Грэхем Ціздэйл і Браян Джэннетт



[1]



[2]

*Teasdale G., Jennett B. Assessment of coma and impaired consciousness: A practical scale. Lancet, 1974 (ii) 81-83.*

# Шкала комы Глазга для дарослых

## Адчыненне вачэй (E, Eye response)

Бал	Характарыстыка
4	Адчыняе самаадвольна, назірае
3	Адчыняе ў адказ на голас
2	Адчыняе ў адказ на болевае раздражненне
1	Не адчыняе

# Шкала комы Глазга для дарослых

## Маўленчая рэакцыя (V, Verbal response)

Бал	Характарыстыка
5	Арыентаваны, хуткі і правільны адказ на зададзенае пытанне
4	Дэзарыентаваны, зблытаная гаворка (вымаўляе фразы, але гаворка няскладная)
3	Слоўная акрошка (прамаўляе асобныя словы, адказ па сэнсе не адпавядае пытанню)
2	Невыразныя гукі ў адказ на дадзенае пытанне
1	Не вымаўляе гукі

# Шкала комы Глазга для дарослых

## Рухальная рэакцыя (M, Motor response)

Бал	Характарыстыка
6	Выкананне рухаў па камандзе
5	Мэтанакіраваны рух у адказ на боль (адштурхванне)
4	Адторгванне ў адказ на боль (бессэнсоўныя рухі)
3	Паталагічнае згінанне ў адказ на боль (дэкартыкацыя)
2	Паталагічнае разгінанне ў адказ на боль (дэцэрэбрацыя)
1	Адсутнасць рухаў

# Дзіцячая шкала комы Глазга

Для дзяцей малодшай 4 гадоў падобная  
шкале комы для дарослых, за  
выключэннем вербальнага адказу

# Дзіцячая шкала комы Глазга

## Адчыненне вачэй (E, Eye response)

Бал	Характарыстыка
4	Адвольнае
3	Як рэакцыя на голас
2	Як рэакцыя на боль
1	Адсутнічае



# Дзіцячая шкала комы Глазга

## Маўленчая рэакцыя (V, Verbal response)

Бал	Характарыстыка
5	Усміхаецца, арыентуецца на гук, сочыць за аб'ектамі, інтэрактыўны
4	Пры плачы можна супакоіць, інтэрактыўнасць няпоўная
3	Пры плачы супакойваецца, але ненадоўга, стогне
2	Не супакойваецца пры плачы, неспакойны
1	Плач і інтэрактыўнасць адсутнічаюць

# Дзіцячая шкала комы Глазга

## Рухальная рэакцыя (M, Motor response)

Бал	Характарыстыка
6	Выкананне рухаў па камандзе
5	Мэтанакіраваны рух у адказ на боль (адштурхванне)
4	Адторгванне канечнасці ў адказ на боль
3	Паталагічнае згінанне ў адказ на боль (дэкартыкацыя)
2	Паталагічнае разгінанне ў адказ на боль (дэцэрэбрацыя)
1	Адсутнасць рухаў

# Інтэрпрэтацыя шкалы комы Глазга

Балы	Характарыстыка
15	Ясная прытомнасць
13-14	Умеранае і глыбокае аглушэнне
9-12	Сопар
4-8	Кома
3	Смерць мозгу