

ПОЧВООБРАЗУЮЩИЕ ПОРОДЫ ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ ПОЛЕСЬЯ (НА ПРИМЕРЕ БРЕСТСКОЙ И ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТЕЙ)

Е.В. Цытрон

**Белорусский государственный педагогический университет
им. М. Танка, г. Минск, Беларусь**

The quantitative rating of main soil rocks of arable lands of Brest and Gomel regions was given on the basis of systematization of regular soil observation.

Процесс формирования почвообразующих пород на территории республики представляет собой циклическую последовательность стадий накопления или сноса материала по отдельным участкам бывших дневных поверхностей и стадий последующей их переработки.

Систематизация и анализ материалов корректировки II тура крупномасштабного почвенного картографирования показал, что в пределах как Брестской, так и Гомельской областей основными почвообразующими породами являются водно-ледниковые, занимающие соответственно 60,6% и 82,1% площади пахотных земель. Довольно значительные территории здесь представлены органогенными почвообразующими породами: 14,1% – в Брестской и 10,9% – в Гомельской областях. Аллювиальные (древний и современный аллювий) породы занимают 16,5% площади пахотных земель в Брестской области и 3,8% – в Гомельской. На лессовидные почвообразующие породы приходится соответственно 2,8% и 3,2%. Для территории Брестской области довольно характерны и моренные отложения. Они занимают 5,7% площади ее пахотных земель. Отдельные территории этой области представлены делювиальными и эоловыми почвообразующими породами.

Таким образом, территория Белорусского Полесья представлена, в основном, всеми генетическими группами почвообразующих пород, встречающихся на территории Беларуси. Исключения составляют озерно-ледниковые отложения.

Все генетические группы почвообразующих пород имеют гомогенное, дву-, трех- и многочленное строение. Характер их распространения отражает характер распространения в разрезе антропогена ледниковых и межледниковых комплексов.